



Num. 1020. Publicado el 14/10/2024

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Trinchisia ocellata*. Por Marcos Fernández Iglesias †



Num. 1020. Publicado el 14/10/2024

Descripciones de especies

Syritta pipiens (Linnaeus, 1758)

Sírfido de 5–9 mm. Una especie pequeña y esbelta con un fémur posterior fuertemente hinchado. Cara sin tubérculo facial, con un denso recubrimie...

Habita en diversos ambientes, como marismas, orillas de cuerpos de agua, bosques húmedos, campos agrícolas y áreas suburbanas, entre otros. Vuela b...

Una especie muy extendida y muy frecuente, que se encuentra tanto en áreas naturales, urbanizadas como en tierras agrícolas...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/syritta-pipiens>

Sisymbrella aspera (L.) Spach

Planta 8-50 cm, anual o perennizante. Tallos erectos o ascendentes, tuberculado-papilosos, sobre todo en la mitad inferior, más raramente glabrescent...

Zonas húmedas, en márgenes de cursos de agua, cunetas y prados húmedos o encharcados, preferentemente en suelos calizos....

SW de Europa (Francia y Península Ibérica) y N de África (Marruecos y Argelia)....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/sisymbrella-aspera>

Mangelia attenuata (Montagu, 1803)

Molusco gasterópodo cuya concha es un cono esbelto, alargado, de hasta 12 mm de longitud, ligeramente translúcido y brillante, con hasta nueve vuelt...

Sublitoral, en fondos de arena o arcilla hasta los 150 m de profundidad....

Distribuida desde el Mediterráneo hasta el norte de Noruega; ausente en el sur del mar del Norte....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/mangelia-attenuata>

Holcus gayanus Boiss.

Hierba anual, aunque con formas cespitosas posiblemente bianuales. Tallos 13-60 cm, simples o a veces ramificados en la base, erectos o





asturnatura

Revista asturnatura.com

ascendentes, c...

Pionera en pastizales en claros de matorral, terrenos rocosos, a menudo rezumantes, en substratos silíceos; 200-1900 m....

C y W de la Península Ibérica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/holcus-gayanus>

Anax imperator Leach, 1815

Libélula cuya longitud varía entre 66 y 84 mm, con una envergadura de las alas posteriores de 45 a 52 mm. El macho presenta la parte superior de los...

Se reproduce en todo tipo de ambientes lénticos, tanto permanentes como estacionales: pozas de aguas remansadas en ríos y arroyos, pequeños embalse...

Europa, excepto regiones septentrionales, África, Oriente y Oeste de Asia....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/anax-imperator>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Asida planipennis Schaufuss, 1869 (Arthropoda)

Diplotomma dispersum (Kremp.) Arnold (Ascomycota)

Gyrographa saxigena (Taylor) Ertz & Tehler, in Ertz, Tehler, Irestedt, Frisch, Thor & van den Boom (Ascomycota)

Pentastiridius leporinus (Linnaeus, 1761) (Arthropoda)

Terebellides shetlandica Parapar, Moreira & O'Reilly, 2016 (Annelida)

