



asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 1037. Publicado el 10/02/2025

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Pycnonotus dodsoni*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 1037. Publicado el 10/02/2025

Descripciones de especies

Uroleucon sonchi (Linnaeus, 1767)

Hembras vivíparas ápteras de color marrón oscuro, brillante; antenas bastante oscuras; patas pálidas, con los ápices de los fémures, rodillas y ...

Las plantas hospedadoras son principalmente especies de *Sonchus*, pero también se ha registrado en *Lactuca sativa*, *Chrysanthemum segetum* y *Cichorium* e...

Cosmopolita...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/uroleucon-sonchi>

Therion circumflexum (Linnaeus, 1758)

Himenóptero que alcanza una longitud corporal de aproximadamente 14 a 25 mm. Cabeza y tórax predominantemente negros. Escutelo amarillo. El abdomen ...

Su hábitat lo constituyen terrenos abiertos caracterizados por arbustos o setos, evitando los bosques oscuros al igual que pastizales extensos sin co...

Esta especie se encuentra muy extendida en gran parte del Paleártico (Europa, Asia, Norte de África), así como en el Neártico (Norteamérica)...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/therion-circumflexum>

Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790)

Hemíptero que alcanza una longitud corporal de 7,1 a 8,4 mm. Cuerpo de color marrón amarillento a marrón oscuro, recubierto de poca pilosidad fina ...

La especie habita en hábitats abiertos (prados, senderos y bordes de bosques), soleados y secos a moderadamente húmedos y, a menudo, se encuentra en...

En Europa, el área de distribución de la especie se extiende en dirección norte-sur desde el sur de escandinavia hasta la región mediterránea. Su...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/stictopleurus-abutilon>

Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)

Los adultos de la lasiocampa del pino presentan una coloración gris parda y una envergadura que oscila entre 55-70 mm en los machos y entre





asturnatura

Revista asturnatura.com

70-90 mm ...

Las mariposas adultas vuelan de junio a septiembre, son exclusivamente nocturnas y viven sólo unos pocos días. Los machos presentan un vuelo ágil y...

Europa, Siberia, norte de África...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/dendrolimus-pini>

Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)

El cisne cantor es una especie de tamaño similar al cisne común, con un peso que oscila entre 8,5 y 10 kg. Aunque en cuanto a dimensiones se asemeja...

Durante la temporada de cría, el cisne cantor prefiere principalmente las áreas de taiga, estableciéndose en una gran variedad de humedales. Durant...

El área de cría del cisne cantor es extensa, abarcando todo el norte del Paleártico, desde Islandia y Noruega hasta Mongolia y el este de Siberia. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/cygnus-cygnus>

