



## Num. 1050. Publicado el 12/05/2025

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Arthonia meridionalis*. Por Marta González García



Num. 1050. Publicado el 12/05/2025

## Descripciones de especies

### *Tetrax tetrax* (Linnaeus, 1758)

A simple vista no resulta sencillo diferenciar a machos y hembras por su tamaño. Sin embargo, en la época de reproducción, los machos lucen un aspe...

El sisón se siente cómodo en hábitats agrícolas abiertos, preferentemente en tierras cerealistas de secano o praderas poco intervenidas. La divers...

De carácter paleártico, el sisón tiene una distribución que va desde la Península Ibérica y el norte africano hasta llegar a China, siempre de m...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/tetrax-tetrax>

### *Lixus cardui* Olivier, 1807

Curculiónido con una longitud de 9 a 14 milímetros. De forma más robusta, más corta y notablemente más ancha que *Lixus elongatus*. Ojos más cerca...

La larva vive y se transforma en los tallos de *Onopordon acanthium*. El adulto se encuentra en la misma planta y en *Onopordon illyricum*. Está parasitad...

Alemania, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, España, Francia, Georgia, Grec...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/lixis-cardui>

### *Graphomya maculata* (Scopoli, 1763)

Mosca con un tamaño de aproximadamente 6 a 8 mm los machos y de 7 a 9 mm las hembras. Aspecto bastante redondo. Tórax gris plateado; mesonoto con 4 ...

Praderas, pastos, bordes de caminos, jardines, parques, riberas de agua,... hábitats con vegetación y lugares húmedos para ovipositar. Los adultos...

Toda Europa, Argelia, Argentina, Cerdeña, China, Córcega, Corea, Costa Rica, Creta, Ecuador, Irán, Isla Reunión, Israel, Japón, Mallorca, Marruec...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/graphomya-maculata>





asturnatura

# Revista asturnatura.com

## *Cryptocephalus rugicollis* Olivier, 1792

Crisomélido con una longitud de 4 a 5 mm. Antenas negras, filiformes, algo más cortas que la longitud del cuerpo. Cabeza, parte inferior del cuerpo ...

Se ha encontrado sobre *Crepis*, *Sonchus tenerrimus* y *Eruca vesicaria*....

Argelia, Cerdeña, España, Francia, Grecia, Italia, Marruecos, Portugal, Sicilia, Turquía....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/cryptocephalus-rugicollis>

## *Columba oenas* Linnaeus, 1758

La paloma zurita (*Columba oenas*) es una especie de ave de tamaño medio, con una longitud de entre 32 y 34 centímetros y una envergadura alar que osc...

Ocupando una variedad de entornos, la paloma zurita se encuentra habitualmente en áreas agrícolas, arboledas abiertas y zonas con cavidades adecuada...

La paloma zurita está distribuida por gran parte de Europa, desde las regiones mediterráneas hasta el sur de los países escandinavos, y desde la Pe...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/columba-oenas>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Arthonia meridionalis* Zahlbr. (Ascomycota)

*Chaenotheca hispidula* (Ach.) Zahlbr. (Ascomycota)

*Cryptocephalus rugicollis* Olivier, 1792 (Arthropoda)

*Lecanosticta acicola* (Thüm.) Syd. (Ascomycota)

*Lixus filiformis* (Fabricius, 1781) (Arthropoda)

