



Num. 1070. Publicado el 29/09/2025

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Physalia physalis*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 1070. Publicado el 29/09/2025

Descripciones de especies

Xema sabini (Sabine, 1819)

La gaviota de Sabine es un ave marina de pequeño tamaño dentro de su grupo, con una longitud de 27-32 cm y una envergadura alar de 83-92 cm. Present...

Durante la época reproductora habita en la tundra ártica, eligiendo enclaves húmedos, islas bajas o marismas, donde nidifica en pequeñas colonias,...

Es una especie circumpolar propia del Ártico. Cría en el norte de Canadá, Alaska, Groenlandia y Siberia, principalmente en tundras costeras y zonas...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/xema-sabini>

Ulex gallii Planch.

Arbusto o sufrútice de hasta 1 m de altura, a veces rastrero. Tallos y ramas con abundantes pelos de dos tipos, unos largos, patentes y otros cortos,...

Brezales, linderos de bosque y taludes; 0-1620 m....

W de Europa, desde Gran Bretaña hasta el NW de la Península Ibérica. N de España, desde Galicia a Navarra; posiblemente introducida en otras provi...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/ulex-gallii>

Pinus nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco

Conífera robusta que puede alcanzar hasta 40 m de altura. En ejemplares jóvenes el ritidoma es ceniciento-plateado y relativamente liso; con la edad...

Prefiere suelos pedregosos y margoso-calizos, aunque también aparece sobre sustratos silíceos. Ocupa laderas, crestas y piedemontes bien drenados, a...

Se distribuye de forma natural por montañas del sur de Francia y por la mitad oriental y parte del centro de la península ibérica. En España es ca...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pinus-nigra-subsp-salzmannii>

Phyllodoce lineata (Claparède, 1870)





asturnatura

Revista asturnatura.com

Poliqueto de cuerpo relativamente uniforme que se afina hacia la parte posterior. El prostomio es pentagonal, muy pigmentado en su frente, con cuatro ...

Aparece desde el intermareal hasta el infralitoral profundo, con registros que alcanzan los 900 m. Prefiere sustratos blandos: lodos terrígenos coste...

Especie ampliamente distribuida en el Atlántico nororiental —desde el mar del Norte hasta el Estrecho de Gibraltar- y en el Mediterráneo occidenta...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/phyllodoce-lineata>

Amblyosyllis spectabilis (Johnston in Baird, 1861)

El cuerpo es relativamente corto y muy segmentado, con 13–14 setígeros. En ejemplares completos suele medir ? 6 mm de largo y alrededor de 0,...

Habita sustratos y biocenosis bentónicas muy variadas: algas superficiales, praderas de posidonia (en rizomas y hojas), coralígeno y precoralígeno ...

Amplia en el Atlántico nororiental (del mar del Norte a Madeira) y presente también en Mediterráneo y mar Negro. Existen citas adicionales en Sudá...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/amblyosyllis-spectabilis>



9 771887506008