



## Num. 1073. Publicado el 20/10/2025

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Calidris minuta*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 1073. Publicado el 20/10/2025

## Descripciones de especies

### *Zygonemertes virescens* (Verrill, 1879)

Nemertino de cuerpo cilíndrico que alcanza los 40-50 mm de longitud, teniendo una anchura de hasta 2 mm y de un llamativo color amarillento verdoso. ...

Entre algas y rocas en el submareal....

Atlántico y Mediterráneo....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/zygonemertes-virescens>

### *Scaurus uncinus* (Forster, 1771)

Tenebriónido con una longitud de 12 a 18 mm. Áptero, de color negro. Cabeza ovalada; con una sutura elevada y angulada hacia atrás entre los ojos. ...

Insecto de hábitos crepusculares y nocturnos, refugándose bajo piedras durante el día. Se alimenta de detritus vegetales y animales. Los imágos pued...

Península Ibérica, Francia, Cerdeña, Italia, Sicilia, Marruecos, Argelia, Túnez, Israel, Bolivia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/scaurus-uncinus>

### *Scaurus rugulosus* Solier, 1838

Tenebriónido con una longitud corporal de 14 a 16 mm, y una anchura de 4 a 6 mm. Coloración negra. Cuerpo ovalado alargado, deprimido en el dorso. C...

Habita en zonas áridas, en suelos arenosos o rocosos. Como las demás especies de este género, es una especie omnívora que se alimenta de restos o...

Sureste y Este de España, y Baleares....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/scaurus-rugulosus>

### *Philocheras trispinosus* (Hailstone in Hailstone & Westwood, 1835)

Crustáceo con una longitud de hasta 27 mm y color pardo amarillento, moteado. En el cefalotórax, más o menos esculpido, el rostro se extiende





asturnatura

# Revista asturnatura.com

hast...

Desde la zona inferior del litoral hasta unos 40 m de profundidad, en costas arenosas y charcas de fondo arenoso....

Presente en todas las costas dentro de la región: desde el sur del mar del Norte y el golfo de Vizcaya hasta el Mediterráneo y Angola....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/philocheras-trispinosus>

## *Haustorius arenarius* (Slabber, 1769)

Isópodo de cuerpo redondeado y rechoncho, de hasta 13 mm y color blanco a amarillo pálido. Cabeza con un pequeño rostro; antena 1 más corta que la...

Habita en arenas limpias de grano medio a grueso, en la zona intermareal, generalmente cerca del punto más alto de emergencia de la capa freática. S...

Común desde Noruega hasta las costas atlánticas francesas....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/haustorius-arenarius>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Scaurus rugulosus* Solier, 1838 (Arthropoda)

*Scaurus uncinus* (Forster, 1771) (Arthropoda)

