



Num. 1079. Publicado el 01/12/2025

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: . Por César Fernández González



Num. 1079. Publicado el 01/12/2025

Descripciones de especies

Timarcha insparsa Rosenhauer, 1856

Insecto con una longitud de 8 a 12mm y forma ovalada, a veces ligeramente oblonga, moderadamente convexa, de color negro mate; la parte inferior y las...

Alta montaña. Se encuentra en un rango altitudinal entre 1200 y 3300 m. Su planta nutricia es *Plantago nivalis* y tanto imagos como larvas se alimenta...

Desde Sierra Nevada hasta las Alpujarras....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/timarcha-insparsa>

Sericostoma personatum (Kirby & Spence, 1826)

Tricóptero cuyos machos tienen el cuerpo de color marrón oscuro, con la cabeza y el tórax cubiertos de pilosidad amarilla o anaranjada. Las antenas...

Se encuentra en ríos, arroyos y lagos con sustratos que varían desde arena hasta guijarros prefiriendo aguas neutras a alcalinas. Tiene un ciclo vi...

Toda Europa....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/sericostoma-personatum>

Ranunculus bullatus L.

Planta vivaz, de (4)6-27 cm, con raíces tuberosas, fusiformes, entremezcladas con otras finas, fibrosas. Hojas todas basales, de orbiculares a ovado-o...

Terrenos incultos, olivares, pastos secos pisoteados y laderas con suelo poco evolucionado, en cualquier tipo de sustrato....

Región mediterránea. Provincias de clima cálido....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-bullatus>

Platnickina tincta (Walckenaer, 1802)

Terfido cuyas hembras alcanzan de 2,5 a 4,2 mm. y los machos 2,5 a 4 mm. Prosoma dorsalmente de color amarillo grisáceo a marrón amarillento





asturnatura

Revista asturnatura.com

claro, ...

Habita en bosques abiertos, secos, de hoja caduca, mixtos y de coníferas. Es un habitante típico de los bosques, donde se le puede encontrar en las ...

Europa, Rusia (parte europea y sur de Siberia), Cáucaso, Turquía, Kazajastan, Iran, Centroamérica y América del Norte, Madagascar. ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/platnickina-tincta>

Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)

Mariposa con una envergadura de 14 a 16 mm. Cabeza, base del ala y dorso, blancos. Alas anteriores de color marrón grisáceo con manchas blanquecinas...

Aparece con frecuencia dentro de edificios residenciales, almacenes y graneros; también en bosques y jardines y, al tener crías de manera continua,

...

Cosmopolita...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/endrosis-sarcitrella>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Carabus lusitanicus subsp. latus Dejean, 1826 (Arthropoda)

Malacochersus tornieri (Siebenrock, 1903) (Chordata)

