



asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 1098. Publicado el 13/04/2026

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Falco peregrinus*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 1098. Publicado el 13/04/2026

Descripciones de especies

Lyrodus pedicellatus (Quatrefages, 1849)

Lyrodus pedicellatus es un bivalvo perforador de madera (taret) con el cuerpo muy alargado y blando, adaptado a vivir completamente dentro de una gale...

Vive en ambientes litorales y portuarios donde existe madera sumergida o semisumergida durante tiempo suficiente para permitir el asentamiento y el cr...

Lyrodus pedicellatus se cita en el Atlántico oriental y en el Mediterráneo, con presencia en costas ibéricas y en numerosos enclaves portuarios del su...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/lyrodus-pedicellatus>

Gallotia caesaris (Lehrs, 1914)

Lagarto pequeño y de forma esbelta, con una longitud de cabeza y cuerpo en machos de 111 mm en El Hierro y 106,5 mm en La Gomera, en tanto que en las...

Especie muy común en el bosque termófilo y en el cardonal-tabaibal de las zonas bajas y medias de La Gomera y El Hierro. Especie escasa en la lauris...

Endemismo macaronésico distribuido por La Gomera y el Hierro. Introducida en Funchal (Madeira) y en la zona de Los Cristianos (Tenerife) Existen dos s...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/gallotia-caesaris>

Cerastium fontanum Baumg.

Hierba perenne o a veces bienal, con renuevos cortos y en ocasiones muy escasos, pudiendo parecer anual. Tallos 5-65 cm, ascendentes, con abundantes p...

Sitios húmedos al borde de los arroyos, roquedos, bosques; fuentes, bordes de cursos de agua, pastos húmedos, tanto en substrato silíceo como caliz...

Cosmopolita...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis





asturnatura

Revista asturnatura.com

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/cerastium-fontanum>

Caucasotachea vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828)

Molusco gasterópodo con concha dextrógira, globular, con una espiral cónica y unas dimensiones de 20 a 25 mm de ancho y de 17 a 21 mm de alto.
Las ...

Se encuentra en bosques abiertos, arbustos y matorrales poco densos, en prados, estepas y laderas rocosas, en llanuras y regiones montañosas cálida...

Se encuentra en Albania, Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Macedon...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/caucasotachea-vindobonensis>

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. in Holl & Heynh.

Hierba anual, de ciclo corto, raramente bienal. Tallo 4-40(70) cm, erecto, simple o ramoso, cubierto en la base por pelos simples y ramificados, glabr...

Campos cultivados e incultos, en terrenos sueltos, generalmente arenosos y secos, bordes de caminos, muros; 0-2400 m....

Subcosmopolita. Toda la Península...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/arabidopsis-thaliana>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Caucasotachea vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828) (Mollusca)

Podops inunctus (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

