



## Num. 119. Publicado el 19/03/2007

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Gibbula cineraria*. Por César Fernández González



### Descripciones de especies

#### *Veronica polita* Fr.

Planta herbácea anual con tallos de hasta 35 cm, procumbentes, ramificados, densamente pelosos. Las hojas, de 6 - 17 x 5 - 15 mm, son opuestas, de co...

Es una planta ruderal, que crece en tierras removidas, nitrificadas, como son las cunetas, márgenes de caminos y cultivos, desde el nivel del mar a l...

Es una planta subcosmopolita que está muy distribuida por la Península....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/veronica-polita>

#### *Veronica persica* Poir.

Planta anual, con tallos decumbentes, en ocasiones ascendentes, de entre 10 y 50 cm, ramificados, con una pilosidad consistente en pelos de hasta 2.2 ...

Crece en zonas nitrificadas, como jardines, bordes de caminos, cultivos, en zonas poco húmedas, desde el nivel del mar a los 1300 m. ...

Subcosmopolita, en la Península aparece en casi todas las provincias....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/veronica-persica>

#### *Veronica mampodrensis* Losa & P.Monts.

Planta sufruticosa, con tallos de 6 - 15 cm, de ascendentes a subrectos, sin pelos o subglabra en la parte basal pero el resto cubierto de pelos tect...

Crece en repisas y grietas en rocas, pastos pedregosos, en calizas preferentemente. Es una planta característica de comunidades pertenecientes al ord...

Se trata de un endemismo de la cordillera cantábrica, que aparece desde el centro de Asturias al NE de Palencia....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/veronica-mampodrensis>

#### *Veronica hederifolia* L.

Planta herbácea anual con tallos de hasta 35 cm, procumbentes, generalmente bastante ramificados y de glabrescentes a pubescente-glandulosos,





asturnatura

# Revista asturnatura.com

provis...

Crece en zonas nitrificadas como márgenes de caminos, jardines, bordes de cultivo, desde el nivel del mar a los 2100 m. Es una planta característica...

Subcosmopolita, aparece en toda la Península y Baleares....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/veronica-hederifolia>

## *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel

Planta herbácea anual hemiparásita, de tallos erectos de hasta 35 cm; son a veces robustos, generalmente poco ramificados, verde amarillentos, con P...

Vive en pastizales, prados, cunetas, taludes, en suelos preferentemente húmedos y nitrificados, desde el nivel del mar a los 1400 m de altitud....

Presente en el oeste y sur de Europa, en la Península aparece ampliamente distribuida. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/parentucellia-viscosa>

## *Galerina marginata* (Batsch) Kühner

Macroscopía. Hongo que forma cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 4 - 8 cm de diámetro, cónico - acampanado al principio, ...

Crece generalmente en grupos sobre tocones, ramas caídas o troncos....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/galerina-marginata>

## *Craterium minutum* (Leers) Fr.

Mixomicete que desarrolla esporocarpos aislados, individuales, con forma de copa y soportados por un corto pie, que alcanza 1 - 1.3 mm de altura. El h...

Bastante frecuente, crece sobre hojas y tallos en descomposición principalmente....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/craterium-minutum>

## *Cortinarius balteatus* (Fr.) Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de 10 - 13 cm de diámetro, con el margen incurvado, y que a veces pre...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Aparece bajo coníferas....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-balteatus>

## ***Coprinus atramentarius*** (Bull.) Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero más o menos extendido, de 5 - 10 cm de diámetro, con la superficie g...

Crece en grupos en el suelo de parques, jardines, bosquetes ruderales y otras zonas similares de influencia humana....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/coprinus-atramentarius>

## ***Balsamia polysperma*** Vittad.

Hongo hipógeo que desarrolla cuerpos fructíferos o ascocarpos irregularmente globulosos de hasta 20 x 18 mm, con la superficie más o menos regular ...

Bajo *Corylus avellana*, *Pinus sylvestris*, *Quercus ilex* subsp. *ballota*....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique, MIRANDA, M.A., LINDE, J., SUÁREZ, A., GARCÍA, F., & JUSTE, P.

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/balsamia-polysperma>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Mycena bulbosa* (Cejp) Kühner (Basidiomycota)

*Mycena corynephora* Maas Geest. (Basidiomycota)

*Mycena crocata* (Schrad.) P. Kumm. (Basidiomycota)

*Mycena pterigena* (Fr.) P. Kumm. (Basidiomycota)

*Mycena renati* Quél. (Basidiomycota)

*Mycena rorida* (Scop.) Quél. (Basidiomycota)

*Mycena rosea* (Bull.) Gramberg (Basidiomycota)





*Parentucellia viscosa* (L.) Caruel (Chloroplastida)

*Polyporus tuberaster* (Jacq.) Fr. (Basidiomycota)

*Stellaria graminea* L. (Chloroplastida)

*Stellaria holostea* L. (Chloroplastida)

*Stellaria media* (L.) Vill. (Chloroplastida)

*Veronica mampodrensis* Losa & P.Monts. (Chloroplastida)



9 771887 506008