



Num. 122. Publicado el 09/04/2007

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Crocicreas tomentosum*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 122. Publicado el 09/04/2007

Descripciones de especies

Rana temporaria Linnaeus, 1758

Se trata de una rana que alcanza gran tamaño, sobre todo las hembras que por lo general son mayores que los machos, así estas pueden medir 7 centímetros...

Muy frecuente. Presente en lagos, lagunas, arroyos, prados encharcados, turberas, etc. y con un muy amplio rango de altitud en su distribución, así pu...

Se encuentra en toda Europa occidental hasta el Cabo Norte, y en Asia llega hasta el Japón....

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rana-temporaria.html>

Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau

Planta perenne, rizomatosa, con tallos simples de los que surgen hojas de 50 x 6 cm, estrechamente lanceoladas, que se estrechan gradualmente en la ba...

Aparece en prados umbrosos, taludes, en bordes de hayedos, cantiles, crestones, etc, desde el nivel del mar hasta los 1600 m de altitud....

Oeste y S de Europa. N y C de la Península Ibérica, más algunas localidades dispersas en el S...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pulmonaria-longifolia.html>

Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)

Chinche que de adulta alcanza los 8 - 14 mm de longitud. Es de forma oval alargada y de color llamativo, rojo y negro; su cabeza es roja y negra, pata...

Vive en céspedes pobres, claros de bosques, matorrales, escombreras, en zonas generalmente calizas. Las larvas y los imagos se alimentan de gran número...

Frecuente en zonas cálidas....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lygaeus-equestris.html>

Lophophanes cristatus Linnaeus, 1758

Pájaro pequeño, de unos 11 centímetros de longitud. Se distingue con facilidad gracias a una llamativa cresta, de color blanco grisáceo y con rayado ...



Habitual en bosques de frondosas y coníferas. La época de cría está entre abril y mayo, en la que realiza normalmente una sola puesta. El nido lo sit...

Presente en casi toda Europa. No se reproduce en Italia, Grecia y resto de países mediterráneos (excepto España), Islandia, y norte de Fenoscandia, as...

Por OLIVEROS PÉREZ, Jesús

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lophophanes-cristatus.html>

Lactarius atlanticus Bon

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 4 - 7 cm de diámetro, convexo, aplanado, con la superficie mate, más...

Crece bajo encinas....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-atlanticus.html>

Inachis io (Linnaeus, 1758)

Mariposa fácil de reconocer por su destacado colorido; sus alas tienen una envergadura de 52 - 58 mm, siendo la hembra mayor que el macho. En el borde...

Aparece en gran cantidad de hábitats, desde el nivel del mar a los 2500 m de altitud. Vuela desde febrero a mayo (ejemplares invernantes) y de junio a...

Especie frecuente, que aparece por toda Europa, hasta los 60° de latitud norte. En la Península Ibérica está distribuida principalmente por la zona no...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/inachis-io.html>

Frangula alnus Mill.

Arbusto o pequeño árbol que alcanza hasta los 4 m de altura. El tronco y las ramas tienen la corteza de color pardo - negruzca. Las ramas son glabras,...

Aparece en bosques acidófilos, como robledales y abedulares, pinares, en zonas próximas a ríos, en zonas iluminadas, como claros y orlas en suelos húm...

Europa, desde el sur de Escandinavia y Siberia y los Urales hasta el norte de África....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/frangula-alnus.html>

Digitalis parviflora Jacq.

Planta anual o bienal con tallos de entre 30 y 60 cm de altura, angulosos, de pubescente a glabra en la parte inferior y más o menos tomentosa en la



P...

Aparece en matorrales, pastizales y roquedos calcáreos, aunque en ocasiones aparece en sustratos algo ácidos, en zonas soleadas y poco nitrificadas, d...

Endémica de las montañas del norte de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/digitalis-parviflora.html>

Cortinarius trivialis J. E. Lange

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero viscoso de 5 - 10 cm de diámetro, más o menos cónico - umbonado, con un...

Bajo árboles planifolios....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-trivialis.html>

Bisporella citrina (Batsch) Korf & S. E. Carp.

Macroscopía. Apotecios discoidales o ligeramente cupulados, sésiles o cortamente estipitados, de hasta 2 - 3 mm, de color amarillo limón a anaranjado,...

Crece sobre ramas caídas desprovistas de corteza de planifolios, especialmente hayas (*Fagus sylvatica*), durante verano y otoño....

Aparece ligada principalmente a zonas donde se encuentran hayas, por lo que es más frecuente en la parte septentrional de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bisporella-citrina.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acrospermum compressum Tode (Ascomycota)

Clitocybe sinopica (Fr.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Frangula alnus Mill. (Magnoliophyta)

Henningsomyces candidus (Pers.) Kuntze (Basidiomycota)

Hyaloscypha britannica Huhtinen (Ascomycota)



Lophodermium conigenum (Brunaud) Hiltzer (Ascomycota)

Lophophanes cristatus Linnaeus, 1758 (Chordata)

Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Melastiza chateri (W. G. Sm.) Boud. (Ascomycota)

Morchella esculenta var. *umbrina* (Ascomycota)

Oxalis acetosella L. (Magnoliophyta)

Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél. (Basidiomycota)

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Parus ater Linnaeus, 1758 (Chordata)

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 (Chordata)

Parus cristatus Linnaeus, 1758 (Chordata)

Periparus ater (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Rana temporaria Linnaeus, 1758 (Chordata)

ISSN 1887-5068



9 771887506008