



## Num. 141. Publicado el 20/08/2007

La revista online *asturnatura.com* es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Gnomoniopsis tormentillae*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 141. Publicado el 20/08/2007

## Descripciones de especies

### *Tilia cordata* Mill.

Árbol de hasta 30 m de altura, con copa amplia, regular, de corteza agrietada longitudinalmente en los adultos y de color pardo grisácea. Las ramita...

Crece en hoces, desfiladeros, barrancos, formando en ocasiones bosques sobre sustratos calizos, desde el nivel del mar a los 1600 m de altitud....

Aparece en casi toda Europa. En la Península sólo en los Picos de Europa, el País Vasco y los Pirineos orientales....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/tilia-cordata>

### *Pyrrhosoma nymphula* (Sulzer, 1776)

Caballito del diablo cuyos adultos miden 33 - 39 mm de longitud, tanto machos como hembras, de cuerpo vigoroso, de dorso generalmente rojo oscuro y zo...

Crece en zonas de aguas quietas, canales estrechos, con abundante vegetación, generalmente ácidos....

Presente en toda Europa, si bien en los extremos norte y sur es más escasa....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pyrrhosoma-nymphula>

### *Osyris alba* L.

Arbusto de 0,5-1,25 m, glabro, con rizomas largos y gruesos. Tallos múltiples, con ramas erectas, longitudinalmente estriadas, verdes. Hojas de (10)15...

Encinares, matorrales, dunas y acantilados costeros; 0-1600 m....

S de Europa, N de África y SO de Asia. Casi toda la Península Ibérica, Mallorca y Menorca...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/osyris-alba>

### *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758)

Los machos suelen ser significativamente más grandes que las hembras, pero existe una considerable variación, especialmente entre los machos. Los ma...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Se encuentra principalmente en bosques cálidos, abiertos, caducifolios viejos (preferiblemente con robles), así como en los bordes de los bosques, p...

Presente en toda Europa, si bien en muchas zonas es ya una rareza....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/lucanus-cervus>

## *Hymenogaster niveus* Vittad.

Basidiocarpos tuberiformes, globulosos, subglobulosos o piriformes, de hasta 23 x 19 mm de diám.; homogéneos o ligeramente lobulados por la presenci...

Es un hongo muy común, asociado mediante micorrizas con multitud de vegetales superiores....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique, MIRANDA, M.A., LINDE, J., SUÁREZ, A., GARCÍA, F., & JUSTE, P.

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/hymenogaster-niveus>

## *Gryllus campestris* Linnaeus, 1758

Insecto fácil de reconocer tanto por su aspecto como por su canto. Los adultos miden entre 17 y 23 mm de longitud; son de color negro brillante, con ...

Son animales crepusculares y nocturnos, aunque es posible verlos activos durante el día, tomando el sol para calentarse, especialmente en primavera y...

Aparece en el centro y sur de Europa....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/gryllus-campestris>

## *Carex durieui* Steud. ex Kunze

Planta perenne cespitosa provista de tallos fértiles de 30 - 50 cm, lisos, delgados y de sección triangular. Las hojas, de 0.5 - 0.8 mm de ancho, so...

Crece en zonas turbosas y prados muy húmedos formados en suelos ácidos, desde los 10 a los 900 m de altitud....

Endémica del NO de la Península Ibérica....

Por LUCEÑO GARCÉS, Modesto & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/carex-durieui>

## *Borago officinalis* L.

Planta herbácea de 30-70 cm, erecta, uni- o multicaule, con indumento setoso-hispido doble, de setas largas hasta de 4 mm y setas cortas





asturnatura

# Revista asturnatura.com

especialmen...

Arvense y ruderal, en substrato básico o ácido, más o menos nitrificado, preferentemente en caliza o arcilla; 0-900 m....

Región mediterránea, SW de Asia, región macaronésica -excepto Cabo Verde-; cultivada y naturalizada prácticamente en toda Europa. Común en casi ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/borago-officinalis>

## *Arctium minus* (Hill) Bernh.

Hierba bienal, por lo general unicaule, verde, con pelos unicelulares araneosos, pelos pluricelulares glandulíferos y glándulas sésiles brillantes....

Herbazales higrófilos junto a cursos de agua, muros y caminos, en substratos ácidos o básicos más o menos nitrificados; 20-1740(1900) m....

La mayor parte de Europa -excepto el Ártico-, SW de Asia, Macaronesia -Madeira- y N de África -Marruecos, Argelia y Egipto-; naturalizada en Nueva Z...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/arctium-minus>

## *Adenostyles alliariae subsp. hybrida* (DC.) Tutin

Planta perenne, con tallos de 60 - 200 cm, erectos, ramificados y flocosos a menudo. Las hojas son alternas; las inferiores de 20 - 50 cm de ancho, de...

Crece en pendientes pedregosas junto a márgenes de arroyos en herbazales megafórbicos, en repisas al pie de roquedos y orlas de bosques frescos, en ...

Endemismo de la cadena pirenaico - cantábrica y el Sistema Central....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/adenostyles-alliariae-subsp-hybrida>

## Novidades corológicas

### *Cantharellus ferruginascens* P. D. Orton (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 18/08/2007

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/cantharellus-ferruginascens-p-d-orton/3248.html>

### *Leucoagaricus medioflavoides* Bon (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 13/08/2007





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Más información en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/leucoagaricus-medioflavoides-bon-1/3197.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Allium vineale* L. (Chloroplastida)

*Cantharellus ferruginascens* P. D. Orton (Basidiomycota)

*Centaurea paniculata* L. (Chloroplastida)

*Clitopilus prunulus* (Scop.) P. Kumm. (Basidiomycota)

*Coprinus narcoticus* (Batsch) Fr. (Basidiomycota)

*Entoloma conferendum* (Britzelm.) Noordel. (Basidiomycota)

*Graddonia coracina* (Bres.) Dennis (Ascomycota)

*Hirundo rustica* Linnaeus, 1758 (Chordata)

*Hygrocybe cantharellus* (Schwein.) Murrill (Basidiomycota)

*Leucoagaricus medioflavoides* Bon (Basidiomycota)

*Melanomma pulvis-pyrius* (Pers.) Fuckel (Ascomycota)

*Peziza ampliata* Pers. (Ascomycota)

*Russula aeruginea* Fr. (Basidiomycota)

*Russula claroflava* Grove (Basidiomycota)

*Salamandra salamandra* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Scleroderma areolatum* Ehrenb. (Basidiomycota)

*Tarzetta velata* (Quél.) Svrček (Ascomycota)

