




asturnatura

# Revista asturnatura.com



## Num. 152. Publicado el 05/11/2007

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Lanzia echinophila*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 152. Publicado el 05/11/2007

## Descripciones de especies

### *Russula sardonia* Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de 10 - 15 cm de diámetro, violáceo, con zonas negruzcas o rojizas y...

Crece bajo pinos en zonas silíceas....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/russula-sardonia>

### *Puccinia violae* (Schumach.) DC., in de Candolle & Lamarck

Hongo de tipo roya, con un ciclo vital complejo, formado por 5 fases que se desarrollan todas en el mismo huésped. Estas fases son las siguientes: Los...

Crece sobre diversas especies del género Viola...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/puccinia-violae>

### *Nepeta cataria* L.

Planta perenne, con tallos erectos de 40 - 100 cm de altura, ramificados, pubescentes o tomentosos. Las hojas son opuestas, pecioladas, de 2 - 8 cm, d...

Crece en herbazales nitrificados desarrollados en cunetas, taludes, caminos, escombreras, en zonas tanto ácidas como básicas, desde los 600 a los 15...

Aparece en la mayoría de Europa, y en la Península crece en la mitad norte principalmente aunque existen poblaciones en el Sistema Bético....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/nepeta-cataria>

### *Muscari comosum* (L.) Mill.

Hierba perenne con un bulbo de 2-4,5(5,5) x (1,8)2-3,5(4) cm, de anchamente ovoide a subgloboso; túnicas de color rosado o rojizo vinoso; bulbillos 0...

Vegetación asociada a cultivos y viaria, pastos vivaces o entre el matorral heliófilo, en substratos calizos o silíceos; 0-1800 m....





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Región mediterránea y fuera de ella alcanza las Islas Canarias y Madeira, el C de Europa, el S de Rusia y Oriente Próximo; naturalizada en Australi...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/muscari-comosum>

## ***Melampyrum pratense* L.**

Planta hemiparásita anual, provista de tallos erectos de 5 - 60 cm de altura. Las hojas son opuestas, de 1 - 35 mm de anchura hasta 10 cm de longitud,...

Crece en bosques, tanto de cóniferas como de caducifolios, en zonas de sustrato ácido, desde el nivel del mar a los 1700 m de altitud. ...

Aparece en el norte y centro de Europa; en la Península especialmente en la parte norte....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/melampyrum-pratense>

## ***Melampsorium betulinum* (Pers.) Kleb.**

Hongo de tipo roya que se desarrolla sobre dos huéspedes diferentes y tiene un ciclo vital complejo, formado por las siguientes 5 fases: Los espermogonios...

Los espermogonios y ecios se forman sobre diferentes especies de pináceas, y las restantes sobre abedules....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/melampsorium-betulinum>

## ***Medicago arabica* (L.) Huds.**

Hierba anual, ascendente, ramificada desde la base, con pelos no glandulíferos pluricelulares, adpresos. Tallos de (10)20-75 cm. Hojas con folíolos d...

Herbazales húmedos; 0-1100 m....

Centro y S de Europa, NO de África, Macaronesia y SW de Asia; introducida en otras partes del mundo. Dispersa por casi toda la Península Ibérica e ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/medicago-arabica>

## ***Gymnosporangium cornutum* Arthur ex F. Kern**

Hongo de tipo roya, con un ciclo vital complejo, formado por 4 fases (carece de uredinios), que se desarrollan todas en diferentes huéspedes. Estas





asturnatura

# Revista asturnatura.com

f...

Los espermogonios y ecios se forman sobre diferentes especies de rosáceas del género *Sorbus*, como *Sorbus aucuparia*, *Sorbus domestica*, *Sorbus interme...*

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/gymnosporangium-cornutum>

## ***Elaphocordyceps ophioglossoides*** (Ehrh.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora

Macroscopía. Ascomas divididos en una parte fértil clavada, la cabeza, y otra estéril, el pie. La primera, de 10 - 20 x 5 - 10 µm, es de color rojo ...

Crece en bosques de coníferas, generalmente entre musgos, parasitando hongos del género *Elaphomyces*, como *Elaphomyces muricatus*, desde julio a novie...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/elaphocordyceps-ophioglossoides>

## ***Acherontia atropis*** (Linnaeus, 1758)

Mariposa fácil de reconocer, con alas de 90 - 130 mm de longitud. El color es variable, sobretodo en su intensidad; las alas anteriores son oscuras, ...

La larva se alimenta de muchas especies de solanáceas, especialmente de patatas (*Solanum tuberosum*), dulcamara (*Solanum dulcamara*), belladona (*Atropa ...*

Aparece en toda Europa y las zonas más sureñas es sedentaria; las de zonas más nórdicas realizan migraciones al sur al llegar el invierno, llegando...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/acherontia-atropis>

## **Novedades corológicas**

### ***Cyathus stercoreus*** (Schwein.) De Toni in Sacc. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 04/11/2007

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/cyathus-stercoreus-schwein-de-toni-1/3751.html>

### ***Phaeohelotium geogenum*** (Cooke) Svrcek & Matheis (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 02/11/2007

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/phaeohelotium-geogenum-cooke-svrc-matheis-1/3743.html>

### ***Puccinia lagenophorae*** Cooke (Basidiomycota)





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 02/11/2007

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografía/setas-y-hongos/puccinia-lagenophorae-cooke-1/3741.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Cantharellus aurora* (Batsch) Kuyper (Basidiomycota)

*Carduus defloratus subsp. medius* (Gouan) Bonnier (Chloroplastida)

*Cyathus stercoreus* (Schwein.) De Toni in Sacc. (Basidiomycota)

*Descolea maculata* Bougher in Bougher & Malajczuk (Basidiomycota)

*Elaphocordyceps ophioglossoides* (Ehrh.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora (Ascomycota)

*Entoloma corvinum* (Kühner) Noordel. (Basidiomycota)

*Geastrum fornicatum* (Huds.) Hook. (Basidiomycota)

*Lactarius quieticolor* Romagn. (Basidiomycota)

*Medicago arabica* (L.) Huds. (Chloroplastida)

*Mycena clavicularis* (Fr.) Gillet (Basidiomycota)

*Nepeta cataria* L. (Chloroplastida)

*Phaeohelotium geogenum* (Cooke) Svrcek & Matheis (Ascomycota)

*Phragmidium violaceum* (Schultz) G. Winter (Basidiomycota)

*Puccinia lagenophorae* Cooke (Basidiomycota)

*Russula caerulea* (Pers.) Fr. (Basidiomycota)

*Russula sardonica* Fr. (Basidiomycota)





**asturnatura**

*Russula turci* Bres. (Basidiomycota)

# Revista asturnatura.com



9 771887 506008