Revista asturnatura.com

Num. 153. Publicado el 12/11/2007

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web http://www.asturnatura.com. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Bela zonata*. Por César Fernández González

ISSN 1887-5068

Num. 153. Publicado el 12/11/2007

Descripciones de especies

Trochila ilicina (Nees) Greenh. & Morgan-Jones

Hongo que forma fructificaciones de hasta 1 mm de diámetro, inmersas bajo la epidermis de la hoja que parasita. Cuando están maduras se abren exponien...

Bastante común en la época apropiada, sobre las hojas muertas y húmedas del acebo (Ilex aquifolium)....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/trochila-ilicina

Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel

Hongo de tipo roya, con un ciclo vital complejo, formado por 5 fases que se desarrollan en dos huéspedes diferentes. Estas fases son las siguientes:Lo...

Los espermogonios y los ecios se desarrollan sobre Anemone, mientras que el resto de las fases parasitan diferentes especies del género Prunus....

Cosmopolita....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/tranzschelia-pruni-spinosae

Serratula tinctoria L.

Hierba perenne, rizomatosa, de un verde intenso, glabrescente, con pelos pluricelulares uniseriados, a veces algunos glandulíferos. Tallos hasta de 12...

Bosques caducifolios, linderos de bosque y matorrales -brezales-, praderas mesofíticas e higrofíticas, cervunales, etc., en suelos preferentemente áci...

Europa, hasta el C de Rusia y NW de África -Argelia-. Mitad septentrional de la Península Ibérica. ...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/serratula-tinctoria

Scorzonera humilis L.

Hierba perenne de (6)10-45(70) cm, rizomatosa, no escaposa, unicaule o multicaule, rosulada; rizoma vertical, leñoso y escamoso en el ápice, con la co...

Pastizales vivaces, prados húmedos, turberas, preferentemente en substrato silíceo y de textura arenoso-arcillosa, en suelos rankeriformes o podsoliza...

Oeste y centro de Europa, alcanza algunas zonas de la Región Mediterránea. Mitad N y O de la Península Ibérica....

ISSN 1887-5068

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/scorzonera-humilis

Sanguisorba minor subsp. minor Scop.

Planta herbácea perenne, de base leñosa, con tallos de 20 - 70 cm, erectos generalmente, con pelos pluricelulares o unicelulares densamente dispuestos...

Crece en prados y herbazales húmedos, en claros de bosques y matorrales, sobre suelos algo removidos, como taludes, cunetas, arenales, tanto en sustra...

Presente en la mayor parte de Europa, en la Península Ibérica es más abundante en la mitad norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/sanguisorba-minor-subsp-minor

Puccinia hieracii (Röhl.) H. Mart.

Hongo de tipo roya, con un ciclo vital complejo, formado por 4 fases que se desarrollan todas en el mismo huésped. Estas fases son las siguientes:Los ...

Crece sobre diversas especies de plantas del género Hieracium....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-hieracii

Phyllactinia fraxini (DC.) Fuss

Hongo que crece en las hojas originando un micelio superficial y casi pulverulento que no invade los tejidos del huésped. Éste es capaz de emitir haus...

Parasita las hojas del fresno (Fraxinus excelsior)....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phyllactinia-fraxini

Phragmidium sanguisorbae (DC.) J. Schröt.

Hongo de tipo roya, con un ciclo vital complejo, formado por 5 fases que se desarrollan todas en el mismo huésped. Estas fases son las siguientes:Los ...

Crece parasitando Sanguisorba minor subsp. minor y Sanguisorba officinalis....

Bastante común en el hemisferio norte....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/phragmidium-sanguisorbae

Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O. K. Mill.

ISSN 1887-5068

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (basidiomas o setas), con un sombrero de 5 - 7 cm, al principio umbonado pero luego plano y viscoso, que se h...

Frecuente en los bosques de Pinus...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/chroogomphus-rutilus

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

Planta anual provista de tallos erectos o procumbentes de hasta 100 cm de longitud, rígidos, harinosos de jóvenes.Las hojas son de color ceniciento y ...

Crece en lugares ruderales cercanos al mar, salinos y nitrogenados....

Aparece dispersa por toda Europa excepto Islandia. En la Península aparece en todas las provincias....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/atriplex-prostrata

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Atriplex prostrata Boucher ex DC. (Chloroplastida)

Byssocorticium pulchrum (S. Lundell) M. P. Christ. (Basidiomycota)

Chroogomphus fulmineus (R. Heim) Courtecuisse (Basidiomycota)

Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O. K. Mill. (Basidiomycota)

Cirsium vulgare (Savi) Ten. (Chloroplastida)

Clinopodium menthifolium subsp. menthifolium (Host) Merino (Chloroplastida)

Coprinus stercoreus Fr. (Basidiomycota)

Euphorbia hirsuta L. (Chloroplastida)

Euphorbia portlandica L. (Chloroplastida)

Geastrum schmidelii Vittad. (Basidiomycota)

Hygrocybe reidii Kühner (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068

Mercurialis annua L. (Chloroplastida)

Phragmidium fragariae G. Winter (Basidiomycota)

Phragmidium sanguisorbae (DC.) J. Schröt. (Basidiomycota)

Phyllactinia fraxini (DC.) Fuss (Ascomycota)

Phyllactinia guttata (Wallr.) Lév. (Ascomycota)

Puccinia chrysanthemi Roze (Basidiomycota)

Puccinia hieracii (Röhl.) H. Mart. (Basidiomycota)

Ramariopsis kunzei (Fr.) Corner (Basidiomycota)

Thelephora palmata (Scop.) Fr. (Basidiomycota)

Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068