



Num. 16. Publicado el 28/03/2005

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Salix triandra*. Por César Fernández González



Num. 16. Publicado el 28/03/2005

Descripciones de especies

Venerupis decussata (Linnaeus, 1758)

Concha de forma oval, de hasta 6 - 7 cm de longitud. Superficie de las valvas con un entramado reticular marcado especialmente en la zona posterior, c...

Enterrado en fondos arenosos o fangosos....

Desde el O de las Islas Británicas al Mediterráneo....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/venerupis-decussata.html>

Venerupis corrugata (Gmelin, 1791)

Concha oval, algo trapezoidal, de hasta 5 cm de longitud. Estrías de crecimiento marcadas que se cruzan con costillas finas. Charnela heterodonta, con...

Enterrada en fondos de arena o grava hasta los 180 m....

De Noruega al Mediterráneo....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/venerupis-corrugata.html>

Pecten maximus (Linnaeus, 1758)

Concha grande, de 13 - 15 cm de longitud. Las valvas son diferentes, siendo la inferior (derecha) plana, y la superior (izquierda) convexa. Ambas está...

Vive en fondos arenosos o de grava, hasta los 100 metros....

Desde Noruega a Portugal....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pecten-maximus.html>

Pecten jacobaeus (Linnaeus, 1758)

Bivalvo con una concha de hasta 13 cm de longitud, con la valva inferior aplanada y la superior convexa. Presentan costillas radiales, de sección rect...

Fondos de arena o grava, en aguas profundas....

Desde Noruega a Portugal....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pecten-jacobaeus.html>

Ostrea edulis Linnaeus, 1758

Concha inequivalva, redondeada, de hasta 10 cm de longitud, la inferior plana, en forma de plato, muy esculpida y generalmente fijada a rocas; la supe...

Infralitoral, hasta 80 metros, fijada a rocas. Concha frecuentemente colonizada por otros organismos....

Desde Noruega a Marruecos y el Mediterráneo....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ostrea-edulis.html>

Magallana gigas (Thunberg, 1793)

Concha bastante grande, de 10 - 15 cm de longitud, alargada, ovalada, con valvas foliosas, desiguales: la interior profunda y más larga que la superio...

Adherida a rocas y piedras en el sublitoral, hasta unos 80 m de profundidad, en aguas calmadas y generalmente cerca de la superficie. Es filtradora....

En toda Europa. Especie invasora, autóctona del SE asiático, incluido Japón, desde donde fue importada, primero a Portugal a principios de 1900 para se...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/magallana-gigas.html>

Dosinia exoleta (Linnaeus, 1758)

Molusco bivalvo con una concha casi circular, de 5 - 6 cm de longitud, inequilateral, con los umbos pequeños pero diferenciables, justo en posición an...

En sedimentos, hasta 100 m de profundidad....

Desde el sur de Noruega al norte de África, también en el Mediterráneo....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dosinia-exoleta.html>

Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758)

El berberecho común tiene una concha ovalada, abombada, de unos 5 cm de longitud. La concha presenta 24 costillas más o menos escamosas, con líneas de...

Desde la franja infralitoral, excavando en sustratos arenosos o fangosos. Puede vivir en estuarios al soportar reducciones de salinidad del 5 por mil....

Desde Noruega y el Báltico hasta la costa oeste de África, incluido el Mediterráneo....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cerastoderma-edule.html>

Acanthocardia echinata (Linnaeus, 1758)

Concha de hasta 7 cm de longitud, asimétrica, con el lado anterior redondeado y el posterior aplanado. Superficie con 18 - 23 costillas, con espinas m...

En fondos de sedimentos, desde los 10 m de profundidad....

Desde Noruega hasta la costa norte de África y el Mediterráneo...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/acanthocardia-echinata.html>

Acanthocardia aculeata (Linnaeus, 1758)

Berbercho grande, de hasta 10 cm de longitud, asimétrica, con el lado anterior redondeado y el posterior aplanado, ligeramente abierta; borde dentado...

Enterrado en fondos arenosos, desde los 10 metros de profundidad....

Desde Noruega hasta la costa norte de África y el Mediterráneo....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/acanthocardia-aculeata.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bowerbankia imbricata (Bryozoa)

Delphinus delphis (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Oblada melanura (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Salpa democratica (Forsk., 1775) (Chordata)

Squalus acanthias Linnaeus, 1758 (Chordata)

ISSN 1887-5068

