



asturnatura

Revista asturnatura.com



## Num. 171. Publicado el 17/03/2008

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Tricholoma saponaceum*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 171. Publicado el 17/03/2008

## Descripciones de especies

### *Streptopelia decaocto* (Frivaldszky, 1838)

Ave de 28 - 33 cm, con machos y hembras de plumaje similar. Tienen color gris claro, ocráceo en la parte superior y rosado en el pecho, y destaca sob...

Aparece especialmente en las cercanías de núcleos urbanos, tales como los extrarradios de las ciudades, pueblos, urbanizaciones, parques, zonas de c...

Aparece en todo el mundo, si bien su área original va desde Turquía y NE de África, por Asia Menor, Palestina, Irak, Irán, Turkestán, India, Sri ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/streptopelia-decaocto>

### *Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich.

Planta perenne, con 2 - 4 tubérculos napiformes de los que surgen tallos de hasta 33 cm, de sección cilíndrica, lisos, glabros en la mitad inferior...

Es posible encontrar esta orquídea en turberas, juncales, brezales húmedos e incluso dunas, desde el nivel del mar a los 1200 m de altitud....

Aparece en el SO y C de Europa; en la Península, es más frecuente en la parte norte y oeste....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/spiranthes-aestivalis>

### *Meles meles* (Linnaeus, 1758)

El tejón es un carnívoro de tamaño medio, que alcanza los 90 cm de longitud, 15 de los cuales corresponden a la cola, y de unos 15 kg de peso. Tiene...

Vive en zonas desde semiáridas a la alta montaña, pero prefiere aquellas de media montaña en las que hay todavía amplios pastos y cobertura vegeta...

Se distribuye por gran parte del Paleártico, desde los 15° N a los 65-70° N, y desde Irlanda a Japón. Los límites de distribución en el norte es...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/meles-meles>

### *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)

Ave de 20 - 25 cm, de plumaje bastante característico. El macho adulto tiene el dorso negro, pero la frente es amarillenta y la nuca roja; mejillas, ...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Vive en toda clase de bosques, desde hayedos y robledales a encinares y pinares, desde el nivel del mar a los 2000 m de altitud, si bien es más frecu...

Especie de distribución mundial que ocupa desde zonas boreales a templado-cálidas del Paleártico, desde Canarias y franja norteafricana hasta Japó...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/dendrocopos-major>

## *Cistus salviifolius* L.

Arbusto de 20 - 90 cm, ramoso, con tallos procumbentes o erectos, cubiertos de finos pelos estrellados o flocosos. Las hojas, opuestas y sin estípulas...

Crece en matorrales, márgenes de encinares, alcornoques y pinares que se forman sobre suelos frescos y arcillosos o arenosos, descalcificados, desde...

Aparece en la Región Mediterránea, desde Portugal a Turquía. En la Península en todas las provincias....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/cistus-salviifolius>

## **Novedades corológicas**

### *Diaporthe scobina* Nitschke (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 14/03/2008

Más información en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/diaporthe-scobina-nitschke-1/4385.html>

### *Encoelia tiliacea* (Fr.) P. Karst. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 10/03/2008

Más información en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/encoelia-tiliacea-fr-p-karst-1/4365.html>

### *Rhizopogon abietis* A. H. Sm. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 13/03/2008

Más información en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/rhizopogon-abietis-a-h-sm-1/4383.html>

### *Thelebolus microsporus* (Berk. & Broome) Kimbr. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 10/03/2008

Más información en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/thelebolus-microsporus-berk-broome-kimbr-1/4368.html>





### Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Ceriporia excelsa* (S. Lundell) Parmasto (Basidiomycota)

*Ceriporia reticulata* (Hoffm.) Domanski (Basidiomycota)

*Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Diaporthe scobina* Nitschke (Ascomycota)

*Encoelia tiliacea* (Fr.) P. Karst. (Ascomycota)

*Gymnoascus reessii* Baran. (Ascomycota)

*Lophodermium gramineum* (Fr.) Chevall. (Ascomycota)

*Meles meles* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Platychora ulmi* (Schleich.) Petr. (Ascomycota)

*Psathyrella spadiceogrisea* (Schaeff.) Maire in Maire & Werner (Basidiomycota)

*Rhizopogon abietis* A. H. Sm. (Basidiomycota)

*Rosellinia thelena* (Fr.) Rabenh. (Ascomycota)

*Thelebolus microsporus* (Berk. & Broome) Kimbr. (Ascomycota)

