



asturnatura

# Revista asturnatura.com



## Num. 188. Publicado el 14/07/2008

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: . Por César Fernández González



Num. 188. Publicado el 14/07/2008

## Descripciones de especies

### *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758)

El zorro es un animal muy conocido y desde antiguo es el protagonista de muchas fábulas y creencias. Su larga y tupida cola, que mide el 70% de la lo...

El zorro habita todo tipo de ambientes, desde zonas subárticas a desérticas, en medios forestales, abiertos o incluso en las cercanías de ciudades....

El zorro es el canívoro más abundante del mundo y se encuentra por gran parte de Europa, excepto el Círculo Polar. En la Península es abundante en...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/vulpes-vulpes>

### *Saxifraga longifolia* Lapeyr.

Planta perenne provista de un indumento de glándulas planas, sésiles y estipitadas, y pelos glandulíferos y no glandulíferos. Tienen una roseta ba...

Crece en las grietas de rocas calizas o espolones calcáreos, desde los 1000 a los 2000 m de altitud. ...

Presente en la Península Ibérica y Marruecos, en la primera aparece en los Pirineos de forma abundante y en la Cordillera Cantábrica esporádicamen...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-longifolia>

### *Rupicapra pyrenaica* Bonaparte, 1845

El rebeco es un animal de pequeño tamaño, más pequeño y esbelto que la cabra montés (*Capra pyrenaica*), pero fuerte. Sus patas son robustas, el cu...

El rebeco es una especie característica del piso subalpino, habitando el límite superior de los bosques y los pastos supraforestales; en verano ocup...

El rebeco se encuentra desde el Cáucaso a la Europa atlántica y aparece en la mayoría de las cadenas montañosas de Europa. En la Península Ibéri...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/rupicapra-pyrenaica>

### *Rosellinia subsimilis* P. Karst. & Starbäck

Ascomycete (pyrenomycete) que forma estromas uniperiteciados, subglobulosos, gregarios, aislados o confluyendo en pequeños grupos. De color





asturnatura

# Revista asturnatura.com

pardo o p...

Sobre restos herbáceos y leñosos diversos....

Parece ser una especie muy común en las regiones alpinas de Europa y Norteamérica, sobre restos herbáceos y leñosos diversos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/rosellinia-subsimilis>

## ***Ranunculus omiophyllus* Ten.**

Planta anual o vivaz, prostrada, acuática, cuyas hojas caulinares son todas laminares, opuestas o alternas, con el limbo de 2 - 26 x 3 - 32 mm, de for...

Este ranúnculo crece en terrenos cenagosos, fuentes o manantiales, en arroyos, acequias, charcas, generalmente en medios pobres en sales y ácidos.

...

Aparece en la Europa atlántica, desde el norte de Francia a Portugal. En la Península aparece en la mitad norte principalmente....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-omiophyllus>

## **Novedades corológicas**

*Rosellinia subsimilis* P. Karst. & Starbäck (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 12/07/2008

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos//5045.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Arenaria erinacea* Boiss. (Chloroplastida)

*Arenaria grandiflora subsp. incrassata* (Lange) C. Vicioso (Chloroplastida)

*Carduus carpetanus* Boiss. & Reut. (Chloroplastida)

*Coprinopsis urticicola* (Berk. & Broome) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)

*Coprinus phaeosporus* P. Karst. (Basidiomycota)





*Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Cyperus eragrostis* Lam. (Chloroplastida)

*Cytisus cantabricus* (Willk.) Rchb. F. (Chloroplastida)

*Geum intermedium* Ehrh. (Chloroplastida)

*Gypsophila repens* L. (Chloroplastida)

*Gyromitra leucoxantha* (Bres.) Harmaja (Ascomycota)

*Lampyris iberica* Geisthardt et al., 2008 (Arthropoda)

*Malacosoma castrensis* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Octaviania asterosperma* Vittad. (Basidiomycota)

*Rosellinia subsimilis* P. Karst. & Starbäck (Ascomycota)

*Saxifraga canaliculata* Boiss. & Reut. (Chloroplastida)

*Scutellaria alpina* L. (Chloroplastida)

*Scutellaria alpina* subsp. *alpina* L. (Chloroplastida)

