



Num. 208. Publicado el 15/12/2008

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Taxus baccata*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 208. Publicado el 15/12/2008

Descripciones de especies

Phyllactinia mali (Duby) U. Braun

Hongo que desarrolla ascomas (cleistotecios) esféricos, superficiales, diminutos, de 170 - 250 μ m de diámetro de color amarillento, anaranjado o...

Parásita de *Crataegus*, *Pyrus*, *Malus* y *Mespilus*....

Ampliamente distribuida en Europa....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phyllactinia-mali.html>

Lactarius hepaticus Plowr. in Boud.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos, setas o basidiomas. Sombrero: de color pardo rojizo, variable según la edad de los ejemplares y las condiciones...

Es una de las especies más frecuentes en los pinares arenosos al final de la temporada....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-hepaticus.html>

Gelidium maggisae

Talo rojo a pardo-rojizo, formado por ramas cilíndricas postradas que sirven de rizoides y ramas erguidas más o menos aplanadas. Tanto las ramas erguidas...

Habita en fondos submareales de maërl, junto con *Gelidiella calcicola*....

Especie restringida a las costas atlánticas europeas (Irlanda y Galicia), siendo las poblaciones gallegas las únicas que se conocen en toda la Península...

Por RICO ORDÁS, J.M.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gelidium-maggisae.html>

Choreonema thuretii F.Schmitz (Bornet)

Alga semiendofítica de la que son visibles únicamente sus conceptáculos sésiles sobresaliendo del huésped. Éstos conceptáculos, calcificados, son de g...

Semiendofítica en *Jania* y *Haliptilon*....

Ampliamente distribuida por aguas marinas templadas y tropicales....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/choreonema-thuretii.html>

Blechnum spicant (L.) Roth

Helecho provisto de un grueso y corto rizoma, con páleas linear - lanceoladas en el ápice de color pardo oscuro. Las frondes, de 8 - 70 x 3 - 7 cm, so...

Crece en zonas sombrías y húmedas sobre suelos ácidos. Es una planta característica de comunidades pertenecientes al orden Quercetalia roboris (clase ...

Aparece en toda Europa, el norte de África y Macaronesia....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/blechnum-spicant.html>

Novedades corológicas

Phyllactinia mali (Duby) U. Braun (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 11/12/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/phyllactinia-mali-duby-u-braun-1/6112.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anser albifrons (Scopoli, 1769) (Chordata)

Anser cignoides (Chordata)

Branta leucopsis (Bechstein, 1803) (Chordata)

Branta ruficollis (Pallas, 1769) (Chordata)

Branta sandvicensis (Vigors, 1834) (Chordata)

Chlorociboria aeruginella (P. Karst.) Dennis ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra (Ascomycota)

Choreonema thuretii F.Schmitz (Bornet) (Rhodophyta)

Cistus ladanifer L. (Magnoliophyta)

Gelidium maggisae (Rhodophyta)

ISSN 1887-5068



Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer (Basidiomycota)

Hygrocybe laeta (Pers.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Inocybe hirtella var. *bispora* (Basidiomycota)

Inocybe hystrix (Fr.) P. Karst. (Basidiomycota)

Lepiota brunneolilacea Bon & Boiffard (Basidiomycota)

Phyllactinia mali (Duby) U. Braun (Ascomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008