



Num. 211. Publicado el 26/01/2009

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Rosellinia thelena*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 211. Publicado el 26/01/2009

Descripciones de especies

Turdus merula subsp. merula Linnaeus, 1758

El mirlo común es un ave bastante común. El macho, de color totalmente oscuro, con el pico amarillo y un anillo ocular del mismo color en primavera y ...

El mirlo vive en zonas arboladas, setos, parques, sotobosques, jardines, matorrales, donde se alimenta de gusanos, insectos, lombrices, frutos, depend...

Aparece en el Paleártico, India y la Región Oriental; está introducido en Australia y Nueva Zelanda. En la Península está ampliamente distribuido, en ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/turdus-merula-subsp-merula.html>

Triturus marmoratus (Latreille, 1800)

El tritón jaspeado es un anfibio común, con los machos de 12 - 13 cm y las hembras de 13 - 14.5 cm, de cuerpo robusto, de sección circular algo depri...

Vive en todo tipo de ambientes acuáticos, generalmente de poca corriente, permanentes o temporales, incluso balsas, charcas, lagunas, abrevaderos, poz...

Presente en el norte, centro y oeste de la Península, centro y oeste de Francia y la costa bretona. En la Península únicamente es posible observarlo e...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/triturus-marmoratus.html>

Tragopogon porrifolius L.

Hierba bienal o perenne de (20)30-70(90) cm, no escaposa, frecuentemente unicaule; rizoma grueso, fusiforme, escamoso en el ápice. Tallos erectos, sim...

Taludes, herbazales y pastizales nitrificados, en substrato calizo, calizo-dolomítico, margoso o yesoso; 50-1700 m....

Europa meridional, SO de Asia, N de África y Macaronesia. Casi toda la Península Ibérica, falta o es más rara en el tercio más occidental, vertiente d...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tragopogon-porrifolius.html>

Eucalyptus camaldulensis Dehnh

Árbol que alcanza los 50 m de altura, siempreverde, con la copa amplia, el tronco grueso, con corteza caediza, lisa, blanca con tonos pardos o



rojizos...

Crece en suelos secos o húmedos desde el nivel del mar a los 600 m de altitud....

Originario de Australia, en la Península Ibérica es la primera especie de eucalipto cultivada....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eucalyptus-camaldulensis.html>

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

El martín pescador es un ave de tamaño pequeño, de 17 - 19.5 cm, incluyendo el pico (de unos 4 cm), de cuerpo rechoncho, patas y cola cortas y cabeza ...

El martín pescador es un ave sedentaria, no muy abundante, que vive en arroyos, ríos, embalses, lagunas y zonas costeras. Nidifica en agujeros (túnele...

Nidifica en el norte de África, casi toda Europa, excepto el norte de Fenoscandia y Rusia, y zonas de Asia central y meridional. Inverna en el sur y c...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/alcedo-atthis.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Cereopsis novaehollandiae Latham, 1802 (Chordata)

Coprotus disculus Kimbr., Luck-Allen & Cain (Ascomycota)

Cyphellopsis confusa (Bres.) Reid (Basidiomycota)

Eucalyptus camaldulensis Dehnh (Magnoliophyta)

Hyphoderma puberum (Fr.) Wallr. (Basidiomycota)

Hypocrea minutispora B.S. Lu, Fallah & Samuels (Ascomycota)

Tadorna variegata (Gmelin, 1789) (Chordata)

Tragopogon porrifolius L. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068

