



## Num. 212. Publicado el 02/02/2009

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Lycoperdon perlatum*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 212. Publicado el 02/02/2009**

## Descripciones de especies

### *Hymenogaster bulliardii* Vittad.

Basidiocarpos compactos y duros, tuberiformes, gibosos, más o menos esféricos, de 10-25- (30) mm de diám. Peridio liso, algo untuoso, generalmente de ...

Suele encontrarse en lugares frescos de bosques de *Quercus* spp., *Fagus sylvatica* y *Corylus avellana*, en altitudes entre 700 y 900 m, a escasa profundi...

Taxon no raro en España peninsular y ampliamente repartido por todo el Estado....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique, MIRANDA, M.A., LINDE, J., SUÁREZ, A., GARCÍA, F., & JUSTE, P.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hymenogaster-bulliardii.html>

### *Gypaetus barbatus* (Linnaeus, 1758)

El quebrantahuesos es un ave de gran tamaño, de entre 105 y 125 cm de longitud y 235 - 275 cm de envergadura, que en vuelo exhibe unas alas estrechas ...

El quebrantahuesos está ligado a cadenas montañosas, donde nidifica por encima de los 1000 m. Se alimenta de animales recién muertos y de carroña; rec...

Presente en Asia, África y Europa, se desconoce su población mundial, pero en Europa y el norte de África está sufriendo una fuerte regresión; en Alem...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gypaetus-barbatus.html>

### *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)

Pequeña ave bastante común, de 13 cm de longitud, con una ala el macho de 10.4 - 11.3 cm, algo más pequeña en la hembra, 28 cm de envergadura y entre ...

De costumbres algo similares a la golondrina, el avión común llega procedente del sur durante marzo y abril, aunque a veces algunos individuos alcanza...

Presenta una amplia distribución paleártica, criando en casi toda Eurasia, noroeste de África, llegando desde Iberia hasta Japón, evitando las zonas d...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/delichon-urbicum.html>

### *Balsamia vulgaris* Vittad.



Ascomarcos tuberiformes de 7-30 mm de diám., irregularmente esféricos, en ocasiones lobulados o incluso cerebriformes por la presencia de netas protu...

Balsamia vulgaris parece ser muy poco exigente en cuanto a sus partenaires, ya que puede asociarse con frondosas, coníferas e incluso con diferentes p...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique, MIRANDA, M.A., LINDE, J., SUÁREZ, A., GARCÍA, F., & JUSTE, P.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/balsamia-vulgaris.html>

## *Anguis fragilis* Linnaeus, 1758

Reptil sin patas cuya cabeza y cuerpo alcanzan los 11 - 19 cm y la cola hasta 1.3 veces esta medida. Su cabeza es pequeña, con el cuello apenas defini...

Tiene una marcada preferencia por los lugares húmedos y sombríos, con vegetación baja y abundante, herbácea, con hojarasca o con musgos y líquenes; as...

Presente en Europa, Turquía, Irán y el oeste de Siberia. En la Península Ibérica en la mitad norte, si bien los límites no están muy definidos...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anguis-fragilis.html>

## **Novedades corológicas**

### *Microthyrium macrosporum* (Sacc.) Höhn. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Infiesto, Piloña. O el día 01/02/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//6445.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Anguis fragilis* Linnaeus, 1758 (Chordata)

*Conocybe aeruginosa* Romagn. (Basidiomycota)

*Gymnomyces xanthosporus* (Hawker) A. H. Sm. (Basidiomycota)

*Gypaetus barbatus* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Hydnobolites cerebriformis* Tul. & C. Tul. (Ascomycota)

*Lachnellula occidentalis* (G.G. Hahn & Ayers) Dharmé (Ascomycota)



*Melanotus horizontalis* (Bull.) P. D. Orton (Basidiomycota)

*Melanotus phillipsii* (Berk. & Broome) Singer (Basidiomycota)

*Microthyrium macrosporum* (Sacc.) Höhn. (Ascomycota)

*Phaeocollybia arduennensis* Bon (Basidiomycota)

*Phaeocollybia festiva* (Fr.) R. Heim (Basidiomycota)

*Phaeocollybia jennyae* (P. Karst.) Romagn. (Basidiomycota)

*Phaeocollybia lugubris* (Fr.) R. Heim (Basidiomycota)

*Pyrola minor* L. (Magnoliophyta)

*Ricinus communis* L. (Magnoliophyta)

*Sclerogaster compactus* (Tul. & C. Tul.) Sacc. (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887506008