



Num. 213. Publicado el 09/02/2009

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Lasiobelonium belanense*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 213. Publicado el 09/02/2009

Descripciones de especies

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

La curruca capirotada es un ave de 14 cm de longitud, el ala de 7 - 7.8 cm en el macho y 6.9 - 8 cm en la hembra, con una envergadura de 23 cm y un pe...

Es un ave forestal que vive en bosques frescos y húmedos, preferentemente en sotos, robledales y encinares cuyo sotobosque esté bien desarrollado, tup...

La curruca capirotada está ampliamente distribuida por Europa, alcanzando por el este las montañas de Irán, el sur de Magreb y Macaronesia; no aparece...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sylvia-atricapilla>

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

El camachuelo es un ave de cuerpo rechoncho, robusto, que parece no tener cuello, de 14 - 14.5 cm de longitud, 27 cm de envergadura y unos 26 g de pes...

Es posible encontrar al camachuelo en zonas montañosas de la región eurosiberiana y en bosques húmedos mediterráneos; en las zonas occidentales de la ...

El camachuelo aparece en toda la región de bosques húmedos de planifolios y coníferas del Paleártico, desde las Islas Británicas a Japón. En España es ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pyrrhula-pyrrhula>

Pyrola minor L.

Planta con tallos de 10 a 25 cm, provistos de hojas dispuestas en rosetas laxas, con una lámina de 2 - 5 x 1 - 4.5 cm, de forma anchamente ovada o ova...

Crece en bosques húmedos, generalmente de coníferas, desde los 900 a los 2100 m de altitud. ...

Aparece en Europa, Asia y el norte de América. En la Península en la Cordillera Cantábrica, los Pirineos, Sistema Ibérico y Sistema Central...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pyrola-minor>

Genabea fragilis Tul. & C. Tul.

Ascomas de hasta 0,7 cm de diámetro, tuberiformes, subglobulosos, con la superficie muy nodulosa, gibosa, sutilmente verrucosa; de color pardo oscuro,...



Hipogeo....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/genabea-fragilis>

Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)

El fumarel cariblanco es un ave de 23 - 29 cm de longitud y 64 - 70 de envergadura, algo mayor que otros fumareles, con patas más largas y grandes, pi...

El fumarel cariblanco se reproduce en lagos interiores, naturales o artificiales, provistos de una buena cobertura vegetal en las orillas, en la que s...

En Europa aparece de forma casi discontinua asociado a humedales interiores y marismas del centro y este de Europa y la Cuenca Mediterránea. Las princ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chlidonias-hybrida>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) (Chordata)

Erucastrum nasturtiifolium subsp. nasturtiifolium (Poir.) O.E. Schulz (Tracheophyta)

Genabea fragilis Tul. & C. Tul. (Ascomycota)

Geopora arenicola (Lév.) Kers (Ascomycota)

Geopora cervina (Velen.) T. Schumach. (Ascomycota)

Marasmiellus foetidus (Sowerby) Antonín, Halling & Noordel. (Basidiomycota)

Natrix maura (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Plicaria leiocarpa (Currey) Boud. (Ascomycota)

Turdus philomelos Brehm, 1831 (Chordata)

ISSN 1887-5068

