



## Num. 223. Publicado el 20/04/2009

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Leucoagaricus tener*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 223. Publicado el 20/04/2009**

## Descripciones de especies

*Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk.

Hierba perenne, con indumento adpreso hialino en densidad variable, que llega a ser seríceo. Tallos de (5)10-30 cm, con costillas longitudinales poco ...

Gieras, canchales, suelos pedregosos, grietas de roquedo, en rocas silíceas o, en las poblaciones orientales, en calizas, incluso en serpentinas; (380...

Endemismo del cuadrante NO de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phalacrocarpum-oppositifolium.html>

*Hypoxylon petriniae* M. Stadler & J. Fourn.

Ascomycete (pyrenomycete) que forma estromas efusos, extendidos por el sustrato, no raramente circulares, de hasta 1-2 mm de grosor y de color pardo-v...

Especie relativamente común sobre la madera de los planifolios (especialmente *Fraxinus*), a menudo confundida con *Hypoxylon rubiginosum*, cuyos estromas...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hypoxylon-petrinae.html>

*Cistus laurifolius* L.

Arbusto de hasta 2 m, con una cepa leñosa de la que surgen tallos erectos y grisáceos, cuya corteza, no pegajosa, se desprende en tiras de color rojo ...

Crece en la orla de robledales, encinares y pinares, en páramos estépicos y zonas pastadas, en laderas y suelos pedregosos, ácidos o calizos descalcif...

Presente en el Egeo, Anatolia y el Mediterráneo occidental. En la Península en el centro, este y sur, siendo escasa o ausente en el litoral atlántico....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cistus-laurifolius.html>

*Chioglossa lusitanica* Barbosa du Bocage, 1864

La salamandra rabilarga es un anfibio de cuerpo alargado, de unos 156 mm en machos y 164 en las hembras. La cabeza, deprimida y redondeada en la parte...

La salamandra rabilarga vive en zonas de clima suave, que tengan precipitaciones anuales superiores a los 1000 mm por metro cuadrado, en zonas de baja...



La salamandra rabilarga es un endemismo de la Península Ibérica y el único representante del género. *Chioglossa lusitánica* alcanza el límite oriental ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chioglossa-lusitanica.html>

## *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)

La alondra común es un ave de unos 18 - 19 cm de longitud, 30 - 36 cm de envergadura, con tonos pardos y estrías oscuras, un pico fuerte, el cuerpo al...

La alondra común es abundante en zonas desarboladas y abiertas, donde vive en áreas cultivadas, pastizales, matorrales bajos (brezales, aulagares,...), ...

Ampliamente distribuida por el Paleártico, la alondra común falta en Europa tan sólo en Islandia y la parte más septentrional de Rusia. En la Península...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/alauda-arvensis.html>

## **Novedades corológicas**

### *Capronia nigerrima* (R.R. Bloxam) M.E. Barr (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Aguino, Somiedo. O el día 19/04/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/capronia-nigerrima-r-r-bloxam-m-e-barr-1/6898.html>

### *Hyphodiscus hymeniophillus* (P. Karst.) Baral (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Malva, Somiedo. O el día 14/04/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hyphodiscus-hymeniophillus-p-karst-baral-1/6870.html>

### *Nitschkia cupularis* (Pers.) P. Karst. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Villar de Vildas, Somiedo. O el día 14/04/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/nitschkia-cupularis-pers-p-karst-1/6865.html>

### *Platystomum compressum* (Pers.) Trevis. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Villar de Vildas, Somiedo. O el día 14/04/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/platystomum-compressum-pers-trevis-1/6867.html>

### *Unguicularia incarnatina* (Quél.) Nannf. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Ramera, Castrillón. O el día 18/04/2009



Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//6889.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Capreolus capreolus* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Capronia nigerrima* (R.R. Bloxam) M.E. Barr (Ascomycota)

*Chaetosphaerella phaeostroma* (Durieu & Mont.) E. Müll. & C. Booth (Ascomycota)

*Chioglossa lusitanica* Barbosa du Bocage, 1864 (Chordata)

*Cistus laurifolius* L. (Magnoliophyta)

*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758 (Chordata)

*Hyphodiscus hymeniophillus* (P. Karst.) Baral (Ascomycota)

*Meloe proscarabaeus* Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

*Nitschkia cupularis* (Pers.) P. Karst. (Ascomycota)

*Phalacrocarpum oppositifolium* (Brot.) Willk. (Magnoliophyta)

*Platystomum compressum* (Pers.) Trevis. (Ascomycota)

*Unguicularia incarnatina* (Quél.) Nannf. (Ascomycota)

*Wisteria sinensis* (Sims) DC. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068

