



Num. 257. Publicado el 01/03/2010

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Cistella albidolutea*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 257. Publicado el 01/03/2010

Descripciones de especies

Taphrina pruni Tul.

Macroscopía: hongo que ataca los frutos jóvenes, aún sujetos al árbol, de diversas especies de ciruelos y cerezos, cubriendo la piel de los frutos, ge...

Ataca diversos árboles del género Prunus, como el ciruelo y el cerezo....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/taphrina-pruni.html>

Satyrium spini (Dennis & Schiffermüller, 1775)

El macho tiene el anverso de color marrón oscuro, el ala anterior con una pequeña mancha androconial alargada, y en ocasiones un pequeño punto anaranj...

Vive en zonas arbustivas, bordes de camino y claros de bosque, desde 200 a 1800 metros. Vuela desde junio a agosto, en una generación al año. Los imag...

Está extendida por el sur y centro de Europa hasta Asia. Está presente en la mayor parte de los sistemas montañosos de la Península Ibérica. En Asturi...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/satyrium-spini.html>

Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E. Schulz

Planta bianual o perennizante, con tallos de 30 - 100 cm de altura, al menos en la parte inferior densamente hispídos. Hojas lirado - pinnatisectas, c...

Crece en herbazales nitrófilos, en viñedos y olivares, matorrales y pastos secos desde el nivel del mar a los 1400 m de altitud....

Presente en el sur de Europa, en la Península aparece en casi todas las provincias salvo las del sur y el noroeste....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erucastrum-nasturtiifolium.html>

Cacyreus marshalli Butler, 1898

Es un licénido de pequeño tamaño, con una envergadura alar de entre 18 y 24 mm. El macho tiene el anverso de color marrón rojizo, con fimbrias ajedrez...

Aparece en setos, jardines y prados de ciudades y pueblos, desde el nivel del mar hasta 400 metros, aunque se han visto ejemplares aislados a elevadas...



Es una especie originaria de Sudáfrica, descrita originariamente por el entomólogo inglés Butler con ejemplares de Cape Town (Sudáfrica). En 1989 se l...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cacyreus-marshalli.html>

Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)

Mariposa con una envergadura alar de 38 - 46 mm. El macho tiene el anverso de color leonado con puntos y dibujos negros, y con el punto discal del anv...

Vive en terrenos abiertos y zonas de matorral, claros y linderos de bosques, desde zonas bajas (raramente) hasta 1.800 metros. Vuela de finales de abr...

Está extendida por Europa y Asia hasta las costas del Océano Pacífico. En la Península Ibérica vuela solamente en la zona norte. En Asturias es poco c...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/boloria-euphrosyne.html>

Novedades corológicas

Cystoderma simulatum P. D. Orton (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Reigada, Candamo. O el día 23/02/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cystoderma-simulatum-p-d-orton-1/8645.html>

