



## Num. 269. Publicado el 24/05/2010

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Hemitrichia serpula*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 269. Publicado el 24/05/2010**

## Descripciones de especies

*Zerynthia rumina* (Linnaeus, 1758)

Mariposa fácil de reconocer por su colorido. El macho tiene el anverso de color de fondo amarillento, con un mosaico de manchas negras y rojas muy dis...

Vive en laderas herbosas y lugares abiertos y secos, desde zonas bajas hasta los 1600 metros. Vuela de marzo a junio, en una generación al año; los im...

Está extendida por el norte de África, la Península Ibérica (salvo la zona cantábrica) y el sur de Francia. No vuela en Asturias. En León está distrib...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/zerynthia-rumina.html>

*Sisyrinchium angustifolium* Mill.

Planta herbácea perenne, cespitosa, de hasta 45 cm. Los tallos son ramificados, comprimidos y con 2 alas, con 1 o 2 nudos, de 2.3 a 5 mm de ancho, gla...

Crece en herbazales en cunetas, orlas y claros de bosques, desde los 10 a 400 m de altitud....

Especie originaria del este de Norteamérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sisyrinchium-angustifolium.html>

*Saccobolus beckii* Heimerl

Macroscopía: ascomycete coprófilo que forma ascomas sésiles, superficiales o subsuperficiales, aislados o gregarios, globulosos a turbinados, blanquec...

Crece sobre excrementos de cérvidos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saccobolus-beckii.html>

*Melampsora hypericorum* (DC.) J. Schröt.

Hongo de tipo roya que desarrolla un ciclo vital en el que forma ecidiosoros hipófilos, redondeados u oblongos, pulvinosos, generalmente pequeños y su...

Crece sobre *Hypericum androsaemum*, *Hypericum humifusum*, *Hypericum perforatum*, *Hypericum pulchrum* y otras especies del género....



Presente en toda Europa....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/melampsora-hypericorum.html>

## *Aristolochia paucinervis* Pomel

Planta perenne con un rizoma tuberoso, fusiforme o cilíndrico, con tallos de hasta 45 cm, numerosos y ascendentes, que se encuentran generalmente rami...

Crece en matorrales aclarados, en cultivos y en zonas ruderalizadas, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud....

Vive en la Región Mediterránea y Macaronésica; en la Península aparece en casi todo el territorio....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aristolochia-paucinervis.html>

## **Novedades corológicas**

### *Dencoeliopsis johnstonii* (Berk.) Korf (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Tineo, Tineo. O el día 19/05/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/dencoeliopsis-johnstonii-berk-korf-1/9081.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Anthocharis belia* (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

*Dencoeliopsis johnstonii* (Berk.) Korf (Ascomycota)

*Graphosoma lineatum* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Lythria purpuraria* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Pogonocherus hispidulus* (Piller & Mitterpacher, 1783) (Arthropoda)

*Rhizotrogus marginipes* Mulsant, 1842 (Arthropoda)

*Semiothisa clathrata* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Sisyrrinchium angustifolium* Mill. (Magnoliophyta)

*Taphrina deformans* (Berk.) Tul. (Ascomycota)



*Trochila craterium* (DC.) Fr. (Ascomycota)

