



asturnatura

# Revista asturnatura.com



## Num. 269. Publicado el 24/05/2010

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Hemitrichia serpula*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 269. Publicado el 24/05/2010

## Descripciones de especies

### *Zerynthia rumina* (Linnaeus, 1758)

Mariposa fácil de reconocer por su colorido. El macho tiene el anverso de color de fondo amarillento, con un mosaico de manchas negras y rojas muy di...

Vive en laderas herbosas y lugares abiertos y secos, desde zonas bajas hasta los 1600 metros. Vuela de marzo a junio, en una generación al año; los ...

Está extendida por el norte de África, la Península Ibérica (salvo la zona cantábrica) y el sur de Francia. No vuela en Asturias. En León está ...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/zerynthia-rumina>

### *Sisyrinchium angustifolium* Mill.

Planta herbácea perenne, cespitosa, de hasta 45 cm. Los tallos son ramificados, comprimidos y con 2 alas, con 1 o 2 nudos, de 2.3 a 5 mm de ancho, gl...

Crece en herbazales en cunetas, orlas y claros de bosques, desde los 10 a 400 m de altitud....

Especie originaria del este de Norteamérica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/sisyrinchium-angustifolium>

### *Saccobolus beckii* Heimerl

Macroscopía: ascomycete coprófilo que forma ascomas sésiles, superficiales o subsuperficiales, aislados o gregarios, globulosos a turbinados, blanq...

Crece sobre excrementos de cérvidos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/saccobolus-beckii>

### *Melampsora hypericorum* (DC.) J. Schröt.

Hongo de tipo roya que desarrolla un ciclo vital en el que forma ecidiosoros hipófilos, redondeados u oblongos, pulvinosos, generalmente pequeños y ...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Crece sobre *Hypericum androsaemum*, *Hypericum humifusum*, *Hypericum perforatum*, *Hypericum pulchrum* y otras especies del género...

Presente en toda Europa....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/melampsora-hypericorum>

## ***Aristolochia paucinervis*** Pomel

Planta perenne con un rizoma tuberoso, fusiforme o cilíndrico, con tallos de hasta 45 cm, numerosos y ascendentes, que se encuentran generalmente ram...

Crece en matorrales aclarados, en cultivos y en zonas ruderalizadas, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud....

Vive en la Región Mediterránea y Macaronésica; en la Península aparece en casi todo el territorio....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/aristolochia-paucinervis>

## **Novedades corológicas**

### *Dencoeliopsis johnstonii* (Berk.) Korf (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Tineo, Tineo. O el día 19/05/2010

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/dencoeliopsis-johnstonii-berk-korf-1/9081.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Anthocharis belia* (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

*Chiasmia clathrata* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Dencoeliopsis johnstonii* (Berk.) Korf (Ascomycota)

*Graphosoma lineatum* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Lythria purpuraria* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Pogonocherus hispidulus* (Piller & Mitterpacher, 1783) (Arthropoda)





*Rhizotrogus marginipes* Mulsant, 1842 (Arthropoda)

*Sisyrrinchium angustifolium* Mill. (Chloroplastida)

*Taphrina deformans* (Berk.) Tul. (Ascomycota)

*Trochila craterium* (DC.) Fr. (Ascomycota)



9 771887 506008