



Num. 274. Publicado el 28/06/2010

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Sorbus hybrida*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 274. Publicado el 28/06/2010

Descripciones de especies

Pyrgus alveus (Hübner, 1803)

Mariposa de aspecto variable, con una envergadura alar de 22 a 28 mm. El macho tiene el anverso de color de fondo pardo-grisáceo oscuro, con las mácul...

Vive en laderas y prados floridos, en terrenos calizos, normalmente en zonas de montaña entre 600 y más de 1.000 metros, aunque puede volar a bajas al...

Está extendida por el norte de África, Europa y Asia. En la Península Ibérica está presente en las principales áreas montañosas, habiéndose descrito l...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pyrgus-alveus.html>

Peziza apiculata Cooke

Macroscopía: ascomas sésiles, brevemente cupuliformes, subturbinados o discoideos de hasta 11 mm de diámetro, con el himenio de color verdoso o verde ...

Este hongo crece sobre madera en descomposición y humus....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/peziza-apiculata.html>

Parus palustris Linnaeus, 1758

El carbonero palustre es un ave de 11.5 cm de longitud y 18 - 19.5 cm de envergadura. Se parece al carbonero garrapino (*Parus ater*), si bien tiene un...

El carbonero palustre vive por lo general en bosques mixtos o dominados por fresnos (*Fraxinus excelsior*), robles (*Quercus robur*) y hayas (*Fagus sylvat...*

Aparece en Europa occidental, desde el tercio norte de la Península hasta los Urales, y también en Mongolia, Corea, China y Japón. En la Península, do...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/parus-palustris.html>

Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)

Mariposa muy polimorfa con una envergadura alar de 42 - 50 mm. El macho generalmente tiene el anverso de color marrón muy oscuro, con ligera



androconi...

Vive en zonas rocosas, terrenos abiertos secos y bordes de caminos, desde el nivel del mar hasta los 1200 metros. Vuela de agosto a septiembre, en una...

Está extendida por el noroeste de África y el sur y centro de Europa hasta Turquía. Está presente en gran parte de la Península Ibérica. En Asturias e...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hipparchia-stalinius.html>

Epilobium duriaei J. Gay

Planta herbácea perenne que pasa la época desfavorable reducida a sus estolones, de hasta 8 cm, carnosos, rojizos o amarillentos, que enraízan en vari...

Crece en zonas húmedas y herbosas, ricas en materia orgánica, especialmente al pie de los peñascos y en comunidades de megaforbios, desde los 1200 a 1...

Aparece en las montañas del centro y SO de Europa, en los Alpes, Jura, Vosgos, Macizo Central francés, y montañas del N de España. Cordillera Cantábri...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/epilobium-duriaei.html>

Novedades corológicas

Incrupila aspidii (Lib.) Raitv. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. O el día 21/06/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/incrupila-aspidii-lib-raity-1/9283.html>

Laetinaevia adonis (Fuckel) Nannf. ex Hein (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. O el día 23/06/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/laetinaevia-adonis-fuckel-nannf-ex-hein-1/9294.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Botryotinia calthae Hennebert & M. E. Elliott (Ascomycota)

Dianthus barbatus L. (Magnoliophyta)

Isatis tinctoria L. (Magnoliophyta)



Peziza apiculata Cooke (Ascomycota)

