



Num. 277. Publicado el 19/07/2010

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Tremella aurantia*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 277. Publicado el 19/07/2010

Descripciones de especies

Polyommatus albicans (Gerhard, 1851)

Mariposa con una envergadura alar de 30 - 36 mm. El macho presenta el anverso de color grisáceo muy claro con aspecto sedoso (semejando casi blanco en...

Vive en prados secos y zonas rocosas, generalmente en terrenos calcáreos, entre 500 y 2000 metros de altitud. Vuela de junio a septiembre en una gener...

Marruecos y Península Ibérica, donde está presente en gran parte del territorio excepto en la zona occidental. En Asturias ha sido citada en Puente de...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polyommatus-albicans.html>

Piceomphale bulgarioides Svr?ek (P.Karst.)

Macroscopía: hongo que forma ascomas estipitados y cupuliformes de hasta casi 10 mm, con el himenio de color oliváceo u oliváceo-negruzco. Su consist...

Es un hongo que vive y fructifica sobre los estróbilos de las píceas tras el deshielo....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/piceomphale-bulgarioides.html>

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

El zarcero común es un ave de pequeño tamaño (13 - 14 cm de longitud y 20 - 24 cm de envergadura), de tonalidad general amarilla verdosa. El dorso es ...

Vive en zonas bajas y cálidas, si bien puede subir hasta los 1900 m de altitud como hace en Sierra Nevada. Es fácil observarlo en ambientes semiabiert...

Aparece como ave reproductora en el SO de Europa y el NO de África. En España aparece de forma continua por todo el territorio, faltando o siendo meno...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hippolais-polyglotta.html>

Colias phicomone (Esper, 1780)

El macho tiene el anverso de color de fondo verdoso-amarillento con un fuerte tono gris, y bordes más oscuros con manchas amarillas; el reverso es



ver...

Vive en laderas pedregosas y prados de montaña, desde 1300 hasta 2100 metros. Vuela de junio a agosto, en una generación al año. Los imagos tienen un ...

Está extendida por macizos montañosos de la Península Ibérica, Francia, Italia, Suiza, Austria, Alemania y Rumanía. En la Península vuela solamente en...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/colias-pticomone.html>

Carex brevicollis DC.

Planta herbácea perenne, cespitosa, con un rizoma grueso, en ocasiones con entrenudos algo alargados. Los tallos fértiles, de 15 a 50 cm, son escábrid...

Crece en zonas pedregosas en las montañas, principalmente en calizas, desde los 900 a los 2100 m de altitud...

Aparece en el SO, SE y CE de Europa y el O de Asia. En la Península Ibérica crece en las montañas calizas del norte....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-brevicollis.html>

Novedades corológicas

Diaporthe oncostoma (Duby) Fuckel (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gera, Tineo. O el día 15/07/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/diaporthe-oncostoma-duby-fuckel/9472.html>

Rickenella mellea (Singer & Clem.) Lamoure (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. O el día 17/07/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/rickenella-mellea-singer-clem-lamoure-1/9479.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Diaporthe oncostoma (Duby) Fuckel (Ascomycota)

Erysiphe knautiae Duby (Ascomycota)

Lactarius pterosporus Romagn. (Basidiomycota)



Lavandula pedunculata (Mill.) Cav. (Magnoliophyta)

Leccinum crocipodium (Letell.) Watling (Basidiomycota)

Margotia gummifera (Desf.) Lange (Magnoliophyta)

Philopodon plagiatus (Arthropoda)

Podarcis bocagei (Lopez-Seoane, 1885) (Chordata)

Puccinia antirrhini Dietel & Holw. (Basidiomycota)

Puccinia eriophori Thüm. (Basidiomycota)

Rickenella mellea (Singer & Clem.) Lamoure (Basidiomycota)

Vibrissea decolorans (Saut.) A. Sánchez & Korf in A. Sánchez (Ascomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008