



## Num. 279. Publicado el 02/08/2010

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Hypochoeris radicata*. Por César Fernández González



Num. 279. Publicado el 02/08/2010

## Descripciones de especies

### *Uromyces polygoni-avicularis* G.H.Otth (Pers.)

Hongo de tipo roya que tiene un ciclo vital completo, formado por las siguientes fases:Espermogonios melosos y cónicos, escasos.Eciosoros generalment...

Crece parasitando Polygonum aviculare....

Cosmopolita....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/uromyces-polygoni-avicularis>

### *Puccinia calthicola* J. Schröt.

Hongo de tipo roya que forma espermogonios anfígenos en las hojas o peciolo en pequeños grupos de 6 a 10, de color pardos al madurar.Los eciosoros ...

Crece sobre Caltha palustris....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/puccinia-calthicola>

### *Phengaris arion* (Linnaeus, 1758)

Licénido de gran tamaño, con una envergadura alar de 32 - 40 mm. El macho tiene el anverso de color azul vivo, con márgenes oscuros anchos, present...

En Asturias esta especie la hemos encontrado en dos tipos de hábitats muy diferentes: en prados húmedos de montaña y en zonas herbosas en lugares c...

Está extendida por gran parte de Europa hasta Asia. En la Península Ibérica está presente en una franja en la zona norte que va desde Galicia a Ca...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/phengaris-arion>

### *Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758)

El zarapito trinador es una limícola de tamaño medio - grande (unos 40 - 42 cm de longitud y 76 - 89 cm de envergadura), de aspecto similar al zarap...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Cría en las cercanías de la costa, pero no está ligado al litoral, por lo que es posible observarlo en zonas interiores como páramos húmedos, bre...

El zarapito trinador se reproduce en las zonas norteñas del hemisferio norte, Norteamérica, Islandia, el norte de Europa y asia; durante la invernada...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/numenius-phaeopus>

## *Carduus tenuiflorus* Curtis

Planta anual o bianual, con tallos de hasta 75 cm, con una pilosidad más o menos aracnoide; el tallo está recorrido por unas alas de hasta 10 mm de ...

Crece en cardales, zonas baldías, cunetas, escombreras, en suelos nitrogenados y removidos, desde el nivel del mar a los 1000 m de altitud....

Aparece en el oeste de Europa....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/carduus-tenuiflorus>

## Novedades corológicas

*Hysteronaevia olivacea* (Mouton) Nannf. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. O el día 28/07/2010

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/hysteronaevia-olivacea-mouton-nannf-1/9555.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Mycenastrum corium* (Guers.) Desv. (Basidiomycota)

*Sarcocapnos enneaphylla* (L.) DC. (Chloroplastida)

*Setina flavicans* (Geyer, 1836) (Arthropoda)

*Valeriana officinalis subsp. officinalis* L. (Chloroplastida)

