



## Num. 307. Publicado el 14/02/2011

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Lathyrus latifolius*. Por José Luis Porto Torres



**Num. 307. Publicado el 14/02/2011**

## Descripciones de especies

*Whalleya microplaca* (Berk. & Br.) J.D. Rogers, Y.M. Ju & F. San Martín

Macroscopía: estromas cortícolos, aplanados, irregularmente elipsoides, de 5-8 mm longitud x 2-4 mm de anchura y 0.4 mm de grosor; gruesos, más delgad...

Es un hongo que parece estar ligado a plantas de la familia Lauraceae....

Cosmopolita. Citado anteriormente en Canarias, esta cita es la primera de Europa continental....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/whalleya-microplaca.html>

*Spialia sertorius* (Hoffmannsegg, 1804)

Mariposa con una envergadura alar de 22 - 26 mm. El macho tiene el anverso de color muy oscuro, con puntos blancos pequeños en ambas alas, y con una s...

Muestra preferencia por los lugares cálidos y secos, como zonas herbosas y secas, márgenes de caminos, zonas de monte bajo y laderas, desde 60 a 1800 m...

Está extendida por el norte de África y sur de Europa hasta Asia. Está presente en prácticamente toda la Península Ibérica, y ampliamente distribuida ...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/spialia-sertorius.html>

*Pleurocybella porrigens* (Pers.) Singer

Macroscopía: sombrero de 2 - 8 cm, de color blanco, al principio de forma redondeada - espatulada o también petaloide y luego con aspecto de concha; m...

Crece formando grupos, muchas veces imbricados, con una clara apetencia por la madera de coníferas....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pleurocybella-porrigens.html>

*Orobanche reticulata* Wallr.

Planta parásita por lo general perenne, con un tallo de hasta 35 cm, no ramificado, de color malva claro y provisto de pelos glandulíferos. Las hojas, ...

Esta planta parasita especies de *Carduus* y *Cirsium*, siendo más raro verla sobre dipsacáceas, como por ejemplo *Scabiosa*....



Aparece en las montañas del sur de Europa: Alpes, Pirineos y Cordillera Cantábrica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/orobanche-reticulata.html>

*Epitonium clathrus* (Linnaeus, 1758)

Molusco de hasta 40 x 12 mm, con la concha de aspecto cónico, formada por hasta 15 vueltas de espira marcadas, de sección circular, que no tienen sutu...

Vive en el sublitoral, en sustratos arenosos o fangosos hasta los 70 m. Puede ser localizado en el intermareal en época de reproducción, durante la cu...

Aparece desde el Mediterráneo hasta Noruega....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/epitonium-clathrus.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Aequipecten opercularis* (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

*Cabestana cutacea* (Linnaeus, 1767) (Mollusca)

*Harmothoe extenuata* (Grube, 1840) (Annelida)

*Hyphodiscus viridipilosus* (Graddon) Baral (Ascomycota)

*Pholcus phalangioides* (Fuesslin, 1775) (Arthropoda)

*Spisula subtruncata* (Da Costa, 1778) (Mollusca)

*Tinea pellionella* Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

ISSN 1887-5068

