




asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 309. Publicado el 28/02/2011

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Ophiobolus acuminatus*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 309. Publicado el 28/02/2011

Descripciones de especies

Ophioglossum lusitanicum L.

Planta vivaz, provista de un corto rizoma, oblongo o subgloboso, pardo, vertical, en ocasiones estolonífera, con gruesas raíces. La fronde está divi...

Crece en pastos efímeros en rellanos con suelo seco gran parte del año, generalmente arenosos. En nuestra región aparece en el piso colino de ombro...

Aparece en la Región Mediterránea, el oeste y el centro de Europa y Macaronesia. En la Península en las zonas de clima suave....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/ophioglossum-lusitanicum>

Handkea utriformis (Bull.) Kreisel

Macroscopía. Fructificaciones de 5 -8 cm de diámetro, que puede alcanzar 7 - 15 cm de altura, al principio globosos, luego piriformes, con un pie es...

Crece en pastizales nitrificados por el ganado, especialmente en los pisos montanos y alpinos, durante primavera - otoño....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/handkea-utriformis>

Entyloma ficariae F. von Thümen ex A.A. Fisch. Waldh.

Hongo de tipo carbón que forma soros aplanados, redondeados o angulares en las hojas, de 1 a 5 mm de diámetro, que al principio son de color blanco ...

Crece parasitando *Ficaria verna*....

Aparece en Europa, el norte de África, el oeste de Asia y probablemente el este de Norteamérica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/entyloma-ficariae>

Diplodonta rotundata (Montagu, 1803)

Molusco con una concha fina, frágil y túmida, de hasta 30 mm. Tiene forma ovalada irregular, con la mitad posterior más profunda que la anterior. L...

Vive en sustratos de arena y grava, desde la costa a los 70 m de profundidad....





asturnatura

Revista asturnatura.com

Desde las costas de Irlanda hasta el Mediterráneo y el oeste de África....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/diplodonta-rotundata>

Baseodiscus delineatus (Delle Chiaje, 1825)

Gusano acintado que alcanza 100 cm de longitud, pero tan sólo 2 - 4 mm de anchura. La cabeza es ligeramente bilobada, deprimida, con hasta 23 ojos en...

Vive en la zona sublitoral entre conchas o gravas con arenas o fango....

Ampliamente distribuido en regiones tropicales y subtropicales....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/baseodiscus-delineatus>

Novedades corológicas

Octosporella erythro stigma (Mont.) Döbberler (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Riera, Somiedo. O el día 21/02/2011

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos//10576.html>

Psilogonium lineare (Fr.) Petr. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Riera, Somiedo. O el día 22/02/2011

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/psilogonium-lineare-fr-petr-1/10582.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Coralliophaga lithophagella (Lamarck, 1819) (Mollusca)

Entyloma ficariae F. von Thümen ex A.A. Fisch. Waldh. (Basidiomycota)

Octosporella erythro stigma (Mont.) Döbberler (Ascomycota)

Psilogonium lineare (Fr.) Petr. (Ascomycota)

Sordaria superba De Not. (Ascomycota)

