



## Num. 322. Publicado el 30/05/2011

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Acacia longifolia*. Por César Fernández González



**Num. 322. Publicado el 30/05/2011**

## Descripciones de especies

### *Teucrium fruticans* L.

Arbusto de 50 - 150(200) cm, muy ramificado, voluminoso, frecuentemente ginodioico. Tallos erectos, foliosos, cuadrangulares; los jóvenes herbáceos, g...

Crece en matorrales heliófilos, claros de encinar, de alcornocal o de pinares, roquedos en substrato calizo o silíceo; desde el nivel del mar a los 1...

Aparece en la Región mediterránea occidental, S de Italia, Sicilia y N de África, en Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Centro y sur de la Península I...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/teucrium-fruticans.html>

### *Puncturella noachina* (Linnaeus, 1771)

Molusco gasterópodo de hasta 7 x 5 x 4 mm, con la concha con forma de sombrero que presenta un pico recurvado que termina en una pequeña espira de has...

Aparece en el intermareal rocoso hasta los 165 m de profundidad, especialmente en zonas ricas en esponjas. Generalmente vive en grupos y se alimenta d...

Circumpolar, que alcanza el sur de Portugal y el Mediterráneo....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puncturella-noachina.html>

### *Psilachnum lanceolatoraphysatum* (Rehm) Höhn.

Macroscopía: ascomas gregarios y sésiles de hasta 1 mm de diámetro, con el himenio de color amarillo pálido u ocre amarillento. Margen provisto de con...

Crece en tallos herbáceos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/psilachnum-lanceolatoraphysatum.html>

### *Melanoleuca brevipes* (Bull.) Pat.

Macroscopía. Hongo que forma fructificaciones con un sombrero de 5 - 10 cm de diámetro, plano convexo al principio, luego algo deprimido en el centro ...

Vive en zonas herbosas, jardines, bordes de camino, pastos, siendo una especie frecuente....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/melanoleuca-brevipes.html>

## *Erebia gorgone* (Boisduval, 1833)

Mariposa con una envergadura alar de 20 - 21 mm. Es de color de fondo marrón oscuro. Tiene bandas rojo oscuro en las alas anteriores y posteriores, ro...

Vive en zonas herbosas en pendientes, entre rocas y pequeños canchales, de 1500 a 2400 metros. Vuela de julio a agosto, en una generación al año. Se d...

Endémica de Pirineos. Es abundante localmente....

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erebia-gorgone.html>

## **Novedades corológicas**

### *Hemaris fuciformis* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Primera cita para Asturias - Citado por José González Fernández en Barayo, Navia. O el día 24/05/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/hemaris-fuciformis/10990.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Dysdera erythrina* (Walckenaer, 1802) (Arthropoda)

### *Hemaris fuciformis* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

### *Melanogaster broomeanus* Berk. ex Tul. & C. Tul. (Basidiomycota)

### *Mengoana jeschawi* (Ortiz de Zárate, 1949) (Mollusca)

### *Oxyloma elegans* (Risso, 1826) (Mollusca)

### *Puncturella noachina* (Linnaeus, 1771) (Mollusca)

### *Syrphus ribesii* Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

