




asturnatura

# Revista asturnatura.com



## Num. 325. Publicado el 20/06/2011

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: . Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 325. Publicado el 20/06/2011

## Descripciones de especies

### *Sphaerellopsis filum* (Biv.) B. Sutton

Hongo hiperparásito no específico de royas (Pucciniales), que forma en el interior de los soros unos conidiomas (picnios) errumpentes, subglobosos, ...

Parasita por lo general uredosoros de numerosas especies de royas (Pucciniales), siendo más raro en eciosoros y teliosoros. Obtiene los nutrientes de...

Ubicuísta....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/sphaerellopsis-filum>

### *Pucciniastrum pyrolae* Dietel ex Arthur

Hongo de tipo roya que desarrolla uredosoros en el envés de las hojas, pequeños y de forma hemisférica, de color anaranjado que se desarrollan sobr...

Crece sobre diversas especies de Pyrola, como Pyrola minor....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pucciniastrum-pyrolae>

### *Euphrasia alpina subsp. alpina* Lam.

Planta herbácea anual, de 3 - 20 (35) cm, en general purpúreas, en general glabras o aveces más o menos hirsutas con pelos tectores. Tallos más o...

Vive en prados secos o semisecos, especialmente en zonas montañosas; desde los 400 a los 2500 m....

Aparece en el norte de la Península Ibérica, Alpes (desde su extremo SO hasta el Engadin) y algunas localidades de los Apeninos. N de la Península,...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/euphrasia-alpina-subsp-alpina>

### *Cuthona caerulea* (Montagu, 1804)

Nudibranquio de hasta 26 mm de longitud. Los tentáculos orales y rinóforos son de color blanco, en los individuos adultos éstos tienen una pigmenta...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Se puede encontrar desde el intermareal hasta los 270 m de profundidad, en fondos rocosos. Se alimenta de hidrarios: Sertularella polyzonias (L.), Ser...

Se distribuye por la costa atlántica europea, también se encuentra en el Mar Mediterráneo. Hay registros en la costa atlántica occidental, tanto e...

Por DÍAZ ÁLVAREZ, Luis Ángel

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/cuthona-caerulea>

## ***Aglaope infausta*** (Linnaeus, 1767)

Mariposa de pequeño tamaño, de 23 mm de envergadura, con las alas anteriores redondeadas y algo transparentes, de color negro. Las posteriores son t...

Vive en lugares cálidos donde existan las plantas nutricias, de junio a agosto (desde abril en localidades muy cálidas), en una generación al año...

Extendida por la Península Ibérica, Francia y Suiza, llegando hasta el sur de Alemania. Ocupa toda la P. Ibérica salvo Galicia y la franja cantábr...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/aglaope-infausta>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Adalia bipunctata* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Anoplodera sexguttata* (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

*Asperugo procumbens* L. (Chloroplastida)

*Carcharodus floccifera* (Zeller, 1847) (Arthropoda)

*Cuthona caerulea* (Montagu, 1804) (Mollusca)

*Diasemia reticularis* (Linnaeus, 1761) (Arthropoda)

*Eurydema cyanea* (Fieber, 1864) (Arthropoda)

*Idaliadoris depressa* (Alder & Hancock, 1842) (Mollusca)

*Malachius bipustulatus* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)





*Nepeta tuberosa* L. (Chloroplastida)

*Puccinia astrantiae* Kalchbr. (Basidiomycota)

*Symphyosirinia chaerophylli* S v r e k (Ascomycota)

## Artículos

### **Bioelementos y biomoléculas inorgánicas**

Por Menéndez Valderrey, J.L.

