



Num. 331. Publicado el 01/08/2011

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Eurygaster testudinaria*. Por César Fernández González



Num. 331. Publicado el 01/08/2011

Descripciones de especies

Trichophaea abundans (P. Karst.) Boud.

Macroscopía. Hongo que forma ascomas gregarios, sésiles y discoideos de hasta 1 mm de diámetro, con un himenio y excípulo de color muy oscuro, neg...

Se trata de un hongo carbonícola...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/trichophaea-abundans>

Puccinia eriophori Thüm.

Hongo de tipo roya, heteroica, que no forma uredosoros en su ciclo vital. Los eciosoros son hipófilos, aparecen reunidos en grupos redondeados sobre ...

Forma los teliosoros en hojas viejas y algo secas de numerosas especies de Eriophorum. Los picnios y ecidiosoros se desarrollan sobre Solidago....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/puccinia-eriophori>

Helix aspersa Müller, 1774

El caracol común se caracteriza por su periostraco pardo dorado característicamente interrumpido por bandas de color pardo. Su concha, de 30 - 35 x ...

Vive entre arbustos, en bosques muy abiertos, en campos y también en zonas dunares. Se alimenta de hierbas y puede ser un problema por esto en huerta...

Aparece en la región mediterránea, las costas atlánticas hasta las Islas Británicas y se introdujo hace siglos en Grecia, las Islas Británicas y ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/helix-aspersa>

Euphorbia dulcis L.

Planta perenne, rizomatosa. Rizoma horizontal, largo, carnoso, articulado, formado por gruesos segmentos contiguos, amarillo. Tallos de (18)27-42(52)...

Crece en prados relativamente húmedos, dentro y fuera de bosques caducifolios, con una clara preferencia por lugares nemorales y eútrofos;





asturnatura

Revista asturnatura.com

rarament...

Aparece desde el centro, oeste y norte de Europa hasta el norte de Rusia. En la Península, principalmente en las montañas del N y NO de la Penínsul...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-dulcis>

Ammothella longipes (Hodge, 1864)

Cuerpo grueso y sólido, un tanto aplanado. Segundo segmento del tronco separado del céfalon en el mismo grado que del siguiente. Los dos últimos se...

Vive en los pisos intermareales y sublitorales de costas rocosas, sobre hidrarios, briozoos y algas....

Se distribuye a lo largo de la costa atlántica europea, desde el oeste del Mar Mediterráneo hasta las Islas Británicas. Esta especie ha sido citada...

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel & DÍAZ ÁLVAREZ, Luis Ángel

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/ammothella-longipes>

Novedades corológicas

Thelephora cuticularis Berk. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en hayedo de Valgrande, Lena. O el día 26/07/2011

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/thelephora-cuticularis-berk-1/11281.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bolbitius reticulatus (Pers.) Ricken (Basidiomycota)

Phragmidium rosae-pimpinellifoliae Dietel (Basidiomycota)

Podospora setosa (G. Winter) Niessl (Ascomycota)

Puccinia punctiformis (F. Strauss) Röhl. (Basidiomycota)

Saccobolus globuliferellus Seaver (Ascomycota)

Thelephora cuticularis Berk. (Basidiomycota)

