



## Num. 349. Publicado el 05/12/2011

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Stachys germanica*. Por José Luis Porto Torres



**Num. 349. Publicado el 05/12/2011**

## Descripciones de especies

### *Podosphaera myrtilina* var. *myrtilina* Kunze

Hongo que desarrolla un micelio anfigeno, efuso, evanescente, con un estado conidial apenas desarrollado; conidios de 27 - 35 x 14 - 18 &micro;m.  
Cuer...

Crece sobre el arándano, *Vaccinium myrtillus*...

Europa, Asia y Norteamérica...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/podosphaera-myrtilina-var-myrtilina.html>

### *Euchloe simplonia* (Boisduval, 1828)

Mariposa con una envergadura alar de 40 - 48 mm. Su aspecto es similar al de *Euchloe crameri*, con la particularidad de que carece de las líneas negras...

Vive en praderas y laderas en montañas, desde 400 metros en desfiladeros, hasta los 1.800 metros. Vuela de abril a julio, según altitud, en una gener...

Está extendida por zonas montañosas de la Península Ibérica, Francia, Suiza e Italia. Su distribución en la Península es más restringida que la de *Euc...*

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euchloe-simplonia.html>

### *Boletus radicans* Pers.

Macroscopía. Boletal con un sombrero de hasta 20 cm de diámetro, al principio globoso, hemisférico, para hacerse luego plano convexo o extendido, con ...

Aparece durante verano y otoño en bosques de frondosas, especialmente de encinas (*Quercus ilex*) y quejigos (*Quercus faginea*), pero también de robles (...)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/boletus-radicans.html>

### *Asperugo procumbens* L.

Hierba anual uni o multicaule, setoso-hispida, con setas de base tuberculada. Tallos de hasta 60 (-100) cm, decumbentes, ascendentes o trepadores, sí...

Es una planta nitrófila, ruderal, arvense, viaria, que crece sobre suelos básicos, particularmente calizas, margas y yesos, siendo más rara sobre suel...



Europa, O de Asia, NO de Africa. N, centro, E y S de la Peninsula Ibérica...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asperugo-procumbens.html>

*Armeria rothmaleri* Nieto Fel.

Planta con cepa ramificada y ramas más o menos largas, cubiertas de abundantes restosfoliares pardo-rojizos. Hojas 15-90 x 3-15 mm, homomorfas, lance...

Crece en fisuras y repisas de roquedos calizos más o menos dolomitizados; 500-1600 m....

Endémica del SO de la provincia de León (Montes Aquilianos) y E de la de Orense....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/armeria-rothmaleri.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Anthracobia melaloma* (Alb. & Schwein.) Boud. (Ascomycota)

*Clavaria incarnata* Weinm. (Basidiomycota)

*Cortinarius arcuatorum* Rob. Henry (Basidiomycota)

*Cortinarius aurilicis* Chevassut & Trescol (Basidiomycota)

*Cortinarius moenne-loccozii* Bidaud (Basidiomycota)

*Cortinarius natalis* var. *natalis* D. Antonini & M. Antonini (Basidiomycota)

*Cortinarius olivaceofuscus* Kühner (Basidiomycota)

*Cortinarius variiformis* Malençon in Malençon & Bertault (Basidiomycota)

*Hemimycena tortuosa* (P. D. Orton) Redhead (Basidiomycota)

*Hygrocybe aurantiosplendens* R. Haller Aar. (Basidiomycota)

*Hygrocybe ceracea* (Fr.) P. Kumm. (Basidiomycota)

*Hygrophorus lindtneri* M. M. Moser (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068



*Lehmannia marginata* (O. F. Müller, 1774) (Mollusca)

*Russula anthracina* Romagn. (Basidiomycota)

*Tuberolachnus salignus* (Gmelin, 1790) (Arthropoda)

