



## Num. 366. Publicado el 02/04/2012

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Dermacentor marginatus*. Por César Fernández González



**Num. 366. Publicado el 02/04/2012**

## Descripciones de especies

### *Platycapnos spicata* (L.) Bernh.

Planta herbácea anual, con tallos de hasta 45 cm, erectos o ascendentes, de color verde claro y foliosos. Hojas alternas bipinnatisectas cuyas divisio...

Forma parte de la vegetación nitrófila, siendo un típico acompañante de cultivos, medios alterados, generalmente sobre suelos ricos en bases. Se trata...

Aparece en el suroeste de Europa, norte de África y Macaronesia. Presente en toda la Península Ibérica excepto en noroeste. También se puede encontra...

Por CANO RUIZ, Judith, CANO RUIZ, Noemí & MARTÍNEZ SAGARRA, Gloria

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/platycapnos-spicata.html>

### *Mesotriton alpestris* (Laurenti, 1768)

El tritón alpino es un anfibio urodelo que alcanza los 120 mm de longitud total, si bien en la Península Ibérica se han observado hembras de hasta 115...

Se localiza en diversos tipos de hábitats, desde pastizales a borques de hayas o robles, y desde el nivel del mar hasta una altitud de 2.200 m. En la ...

La especie se distribuye por gran parte de Europa Central, desde Dinamarca y el oeste de Francia hasta Ucrania y el sur de Grecia, incluyendo los Alpe...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mesotriton-alpestris.html>

### *Lycaena bleusei* Oberthür, 1884

Mariposa con una envergadura de 24-30 mm, variable. El macho tiene el anverso de las alas anteriores de color de fondo leonado, con grandes máculas ne...

Vuela de abril a septiembre, en varias generaciones. Prefiere los lugares húmedos: orillas de arroyos, prados, claros de bosque..., desde altitudes medi...

Es un endemismo de la zona central de la Península Ibérica. Algunos autores la consideran una subespecie de *H. tityrus*. ...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lycaena-bleusei.html>

### *Lentithecium aquaticum* Yin. Zhang, J. Fourn. & K.D. Hyde



Ascomas de 130-160 µm de altura y 240-320 µm de diámetro, dispersos, sumergidos, lenticulares, con la base aplanada, papilados, que sobresalen ligeram...

Vive en madera sumergida en el agua dulce de los ríos...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lentithecium-aquaticum.html>

## *Dermacentor marginatus* (Sulzer, 1776)

Macho. Macho de cuerpo oval alargado, estrechándose en la mitad anterior, generalmente muy ornamentado pero variando la intensidad de color.Capitulum ...

Esta es una especie con ciclo trifásico y ditrópico, en el que los inmaduros se alimentan preferentemente sobre pequeños mamíferos (roedores, lagomorf...

*Dermacentor marginatus* está distribuida en Alemania, Albania, Austria, Bulgaria, Checoslovaquia, España, Hungría, Italia, Rumania, Líbano, Suiza, Rusi...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dermacentor-marginatus.html>

## **Novedades corológicas**

### *Araniella inconspicua* (Simon, 1874) (Arthropoda)

Nueva para Asturias - Citado por Juan Luis Menéndez en La Malva, Somiedo. O el día 26/03/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/araniella-inconspicua/12410.html>

### *Lentithecium aquaticum* Yin. Zhang, J. Fourn. & K.D. Hyde (Ascomycota)

Nuevo para Asturias. - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arbeyales, Somiedo. O el día 01/04/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lentithecium-aquaticum-yin-zhang-j-fourn-k-d-hyde-1/12438.html>

### *Thelebolus stercoreus* Tode (Ascomycota)

Nuevo para Asturias. - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Sabadel, Tineo. O el día 01/04/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/thelebolus-stercoreus-tode-1/12435.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Dermacentor marginatus* (Sulzer, 1776) (Arthropoda)



*Lentithecium aquaticum* Yin. Zhang, J. Fourn. & K.D. Hyde (Ascomycota)

*Platycapnos spicata* (L.) Bernh. (Magnoliophyta)

*Reticularia lycoperdon* Bull. (Mycetozoa)

*Simethis mattiazzii* (Vand.) Sacc. (Magnoliophyta)

*Thelebolus stercoreus* Tode (Ascomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008