



## Num. 372. Publicado el 14/05/2012

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Bispora scolochloae*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 372. Publicado el 14/05/2012**

## Descripciones de especies

*Prosorhochmus claparedii* Keferstein, 1862

Pequeño nemertino, que puede alcanzar 35-40 mm de longitud y 1-1,5 de anchura. La cabeza está diferenciada del tronco y es espatulada y bilobada anter...

Se suele encontrar debajo de piedras y rocas en arena gruesa o en fisuras de rocas en la zona litoral media o superior, donde aparece con colémbolos, ...

Se distribuye por las costas atlánticas de Inglaterra, Francia y la Península Ibérica, en el Mar Mediterráneo y, posiblemente, en el Mar Negro (Maslak...

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando Ángel & FERNÁNDEZ-ALFAYA, José Elías

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/prosorhochmus-claparedii.html>

*Podospora dakotensis* (Griffiths) J. H. Mirza & Cain

Hongo que desarrolla fructificaciones de tipo peritecio, dispersos, superficiales pero con la base ligeramente inmersa, estrechamente piriformes, de 4...

Vive sobre excrementos de conejo, ovejas, ganado bovino,.....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/podospora-dakotensis.html>

*Juncus inflexus* L.

Planta herbácea perenne, muy cespitosa, con un rizoma del que surgen tallos erectos, cilíndricos, de 20 a 90 cm de altura y hasta 2.5 mm de diámetro, ...

Este junco forma parte de las praderas - juncuales permanentemente nitrificadas y húmedas, propias de suelos cenagosos y cauces de ríos, desde el nivel...

Aparece en Europa, el N, S y E de África y del SO al centro de Asia; ha sido introducido en algunas zonas de América, Australia y Nueva Zelanda. En la...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/juncus-inflexus.html>

*Hypoxyton vogesiacum* (Curr.) Sacc.

Macroscopía. Este hongo produce estromas efusos y pulvinados de hasta 15 x 5 mm y 1 mm de altura, elípticos, generalmente más largos que anchos, duros...



*Hypoxylon vogesiacum* fue descrito por primera vez en *Acer pseudoplatanus*, encontrándose en el norte de Europa principalmente en *Ulmus*, pero también ha...

Su distribución es fundamentalmente hemiboreal, por lo que la nuestra parece ser una cita muy meridional para esta especie. ...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hypoxylon-vogesiacum.html>

## *Hancockia uncinata* (Hesse, 1872)

Nudibranquio de unos 15 mm de longitud, con el cuerpo de color rosado translúcido o verdoso con manchas blanquecinas opacas dispersas sobre toda la su...

Se ha descrito la alimentación de este nudibranquio en el hidrozoo *Clytia haemisphaerica*, que crece a menudo sobre otros hidrozooos y algas....

Aparece en el Atlántico NE, desde el sur de las Islas Británicas, el NO de Irlanda y Escocia hasta el Mediterráneo occidental....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hancockia-uncinata.html>

## Novidades corológicas

### *Enchnoa infernalis* (Kunze) Fuckel (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arbeyales, Somiedo. O el día 13/05/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/enchnoa-infernalis-fr-fuckel-1/12713.html>

### *Felimare fontandraui* (Pruvot-Fol, 1951) (Mollusca)

Nuevo para Galicia - Citado por Marcos Fernández Iglesias en Playa de Temperán (zona medio/externa de la Ría de Vigo), Cangas. Po el día 07/05/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/felimare-fontandraui-1/12673.html>

### *Hypoxylon vogesiacum* (Curr.) Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arbeyales, Somiedo. O el día 07/05/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hypoxylon-vogesiacum-currey-sacc-1/12670.html>

### *Lopadostoma quercicola* Jaklitsch, J. Fourn. & Voglmayr (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arbeyales, Somiedo. O el día 07/05/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lopadostoma-quercicola-jaklitsch-j-fourn-voglmayr-1/12666.html>

### *Splanchnonema pupula* (Fr.) Kuntze (Ascomycota)



Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Fontanina, Corvera de Asturias. O el día 11/05/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/splanchnonema-pupula-fr-kuntze-1/12702.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Amphisphaeria millepunctata* (Fuckel) Petrak (Ascomycota)

*Bispora scolochloae* (De Not.) Spooner (Ascomycota)

*Doto eireana* Lemche, 1976 (Mollusca)

*Enchnoa infernalis* (Kunze) Fuckel (Ascomycota)

*Hancockia uncinata* (Hesse, 1872) (Mollusca)

*Morchellium argus* (Milne-Edwards, 1841) (Chordata)

*Rhodocollybia prolixa* var. *distorta* (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. (Basidiomycota)

*Splanchnonema pupula* (Fr.) Kuntze (Ascomycota)

