



asturnatura

Revista asturnatura.com



## Num. 376. Publicado el 11/06/2012

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Onchidoris pusilla*. Por Luis Ángel Díaz Álvarez



Num. 376. Publicado el 11/06/2012

## Descripciones de especies

### *Tritonia manicata* Deshayes, 1853

Nudibranquio de hasta unos 15 mm de longitud, con el cuerpo blanquecino translúcido con grandes manchas de color pardo oscuro, verdosas o negruzcas d...

Vive en aguas poco profundas, entre algas. En el Mediterráneo se ha observado que se alimenta de Cornularia cornucopiae. ...

Es común al menos entre el Mediterráneo norte desde Turquía a la Península Ibérica, y también desde el norte de Marruecos a el sur de las Islas ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/tritonia-manicata>

### *Onchidoris pusilla* (Alder & Hancock, 1845)

Nudibranquio de cuerpo aplanado que generalmente no supera los 9 mm de longitud. Los individuos juveniles tienen el cuerpo translúcido y blanquecino,...

Vive en fondos rocosos, aguas poco profundas, donde se alimenta de diversos briozoos como Escharella immersa, Microporella ciliata, Escharoides coccin...

Se distribuye por la costa atlántica europea desde la Península Ibérica hasta Noruega, incluyendo las Islas Británicas. También se encuentra en e...

Por DÍAZ ÁLVAREZ, Luis Ángel

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/onchidoris-pusilla>

### *Nemania aureolutea* (L. E. Petrini & J. D. Rogers) Granmo

Macroscopía. Ascomycete que forma estromas superficiales, dispersos, circulares o irregulares, de consistencia carbonácea y pequeño tamaño, hasta ...

Crece sobre madera de planifolio....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/nemania-aureolutea>

### *Miyagia pseudosphaeria* (Mont.) Jørst.

Hongo de tipo roya en cuyo ciclo vital aparecen las siguientes fases: Picnidios epífilos, raros, que preceden la aparición de los uredosoros. Uredoso...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Crece en hojas, más raro en tallos, de varias especies del género *Sonchus* como *Sonchus arvensis*, *Sonchus tenerrimus*, *Sonchus oleraceus*,.....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/miyagia-pseudosphaeria>

## ***Lythrum junceum*** Banks & Sol. in Russell

Planta perenne de 20 a 50 cm, ramificada desde la base, con un tallo ascendente y de sección cuadrangular, glabro, en ocasiones con la base rojiza.La...

Vive en pastos húmedos y herbazales vivaces, desde el nivel del mar a los 3400 m de altitud....

Aparece en la Región Mediterránea (sur de Europa y NO de África) y Macaronesia. En la Península aparece en casi todo el territorio....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/lythrum-junceum>

## **Novedades corológicas**

### *Melanconis modonia* Tul. & C. Tul. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Cancienes, Corvera de Asturias. O el día 08/06/2012

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/melanconis-modonia-tul-c-tul-1/12958.html>

### *Podospora squamulosa* (P. Crouan & H. Crouan) Niessl (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. O el día 07/06/2012

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/podospora-squamulosa-h-crouan-p-crouan-niessl-1/12947.html>

### *Thanatus formicinus* (Clerck, 1757) (Arthropoda)

Primera cita para Asturias - Citado por Esteban Guerra Martín en Proximidades al Pto.de la Cubilla, Lena. O el día 07/06/2012

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/invertebrados/thanatus-formicinus/12946.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Lotus maritimus* L. (Chloroplastida)

### *Melanconis modonia* Tul. & C. Tul. (Ascomycota)





*Neonectria coccinea* (Pers.) Rossman & Samuels (Ascomycota)

*Onchidoris pusilla* (Alder & Hancock, 1845) (Mollusca)

*Phoca vitulina* Linnaeus, 1758 (Chordata)

*Podospora fimiseda* (Ces. & De Not.) Niessl (Ascomycota)

*Podospora squamulosa* (P. Crouan & H. Crouan) Niessl (Ascomycota)

*Thanatus formicinus* (Clerck, 1757) (Arthropoda)



9 771887 506008