



Num. 410. Publicado el 04/02/2013

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Pyrenaearia cantabrica*. Por César Fernández González



Num. 410. Publicado el 04/02/2013

Descripciones de especies

Pyrenaearia cantabrica (Hidalgo, 1873)

Molusco terrestre con una concha de 4-6 x 10.5-14 mm, muy delgada, de color marfileño, transparente pero no brillante, finamente estriada; los juvenil...

Vive en zonas rocosas, bajo salientes de rocas en zonas secas donde suelen tener pelos para retener la humedad de la niebla, o en zonas verticales cua...

Endémico del norte de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pyrenaearia-cantabrica.html>

Lycoperdon molle Pers.

Macroscopía. Cuerpos fructíferos de esféricos o piriformes a turbinados, de 20-40 mm de diámetro a 25-50 mm de altura, con la base, estéril, a modo de...

Vive en bosques de planifolios, siendo más raro encontrarlo en formaciones de coníferas, durante primavera y otoño....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lycoperdon-molle.html>

Inachus leptochirus Leach, 1817

Cangrejo con una caparazón de 21 a 30 mm, estrechado en la parte anterior, con la superficie cubierta de pequeñas sedas con forma de gancho a las que ...

Vive en el rango entre la marea baja y los casi 150 m de profundidad en sustratos con piedras y conchas, menos frecuentemente en fondos arenosos....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/inachus-leptochirus.html>

Dianthus barbatus L.

Planta perenne, con renuevos. Cepa gruesa, oblicua. Tallos floríferos(20)30-50(75) cm, erectos, gruesos, inferiormente no angulosos y no ramosos,g...

Aparece en matorrales de rododendro y pastos del piso subalpino, principalmente; en suelos ácidos, desde los 1600 a los 2400 m de altitud en la zona d...

Europa meridional, Caucasia y Armenia; ampliamente introducida en otras regiones. Pirineos centrales. Cultivada y asilvestrada en otros lugares....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dianthus-barbatus.html>

Ballota nigra L.

Hierba 15-82 cm, perenne. Tallos acanalados en las caras y con cantos engrosados, más o menos pelosos, frecuentemente más pelosos en los cantos, con ...

Vive en los lugares nitrificados húmedos, junto a cursos de agua o en prados umbríos, indiferente edáfica des de los 5 a los 1500 m de altitud....

Región mediterránea, Europa y SW de Asia. Casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ballota-nigra.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Chondrina kobelti (Westerlund, 1878) (Mollusca)

Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell (Pteridophyta)

Cystopteris viridula (Desv.) Desv. (Pteridophyta)

Inachus leptochirus Leach, 1817 (Arthropoda)

Inachus thoracicus Roux, 1830 (Arthropoda)

Lamprospora tuberculatella Seaver (Ascomycota)

