



Num. 428. Publicado el 10/06/2013

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Dicata odhneri*. Por Ricardo R. Fdez



Num. 428. Publicado el 10/06/2013

Descripciones de especies

Puccinia cnici H. Mart.

Hongo de tipo roya cuyo ciclo vitan presenta las siguientes fases: Picnidios epífilos, en ocasiones en los peciolos, esparcidos o agrupados en pequeños...

Crece en hojas y peciolo de varias especies de *Cirsium*, como *Cirsium eriophorum*....

En toda la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-cnici.html>

Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805)

Macrothele calpeiana es quizás, con sus 7 cm de longitud, la araña más grande de Europa. Es de color negro mate o pardo oscuro en algunos individuos, ...

Vive en distintos tipos de bosques y matorrales. Dentro de su área de ocurrencia son los alcornoques, quejigales y encinares los bosques más frequent...

Macrothele calpeiana se encuentra restringida al sur de España. Existen dos citas en el norte de África: la primera de El Aruch, cerca de Constantin...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/macrothele-calpeiana.html>

Euphorbia amygdaloides L.

Planta perenne, a menudo multicaule. Rizoma leñoso, reptante. Tallos hasta de 90 cm, algo leñosos en la base, erectos, afilos en la parte inferior, m...

Bosques húmedos y comunidades algo degradados, desde encinares a alisedas, frecuente en hayedos, desde los 50 a los 1800 m de altitud....

Europa y Cáucaso hasta el Irán, N de África (Argelia y Túnez), introducida en Sudáfrica. General en el N y O de la Península, localizada en las sierr...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-amygdaloides.html>

Epipactis tremolsii Pau

Orquídea con un rizoma cilíndrico, con raíces carnosas, finas, numerosas. Tallos 20-60(70)cm, de ordinario solitarios -más raramente en grupos de 2-...

Bosques de diversos tipos, como encinares, alcornoques, quejigales, pinares, sabinas, etc., y sus orlas, en substratos no muy secos, principalment...

Mediterráneooccidental -del S de Francia y S de Portugal al Magreb-. Dispersa por casi toda la Península....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/epipactis-tremolsii.html>

Dicata odhneri (Schmekel, 1967)

Pequeño nudibranquio, de hasta unos 13 mm de longitud, translúcido, con el cuerpo cubierto de numerosos parches blancos opacos, que están ausentes en ...

Vive en sustratos rocosos a poca profundidad. Se desconocen sus hábitos alimentarios....

Sur de Inglaterra, Cantábrico, Portugal y Mediterráneo Occidental y Central....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dicata-odhneri.html>

Novedades corológicas

Discostroma massarina (Sacc.) Arx (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. O el día 09/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/discostroma-massarina-sacc-arx-1/15554.html>

Godronia fuliginosa (Pers.) Seaver (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. O el día 09/06/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/godronia-fuliginosa-pers-seaver-1/15557.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. (Magnoliophyta)

Discostroma massarina (Sacc.) Arx (Ascomycota)

Godronia fuliginosa (Pers.) Seaver (Ascomycota)

Oedionychus cinctus (Fabricius, 1781) (Arthropoda)

Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel (Magnoliophyta)

Reseda barrelieri Bertol. (Magnoliophyta)

