



## Num. 462. Publicado el 03/02/2014

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Scaeva pyrastris*. Por José Rafael González López



**Num. 462. Publicado el 03/02/2014**

## Descripciones de especies

*Scaeva pyrastris* (Linnaeus, 1758)

Sírfido de una longitud de unos 10-12 milímetros, con el tórax de un intenso color bronceado y el abdomen negro, atravesado en horizontal por cinco lí...

En estado adulto se alimenta del néctar y polen de las plantas, mientras que en la fase larvaria se alimenta de pulgones, cochinillas y trips. El ...

*Scaeva pyrastris* es corriente en casi toda Europa y Asia, apareciendo también en el norte de África y en América del Norte. Se trata de una especie mu...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scaeva-pyrastris.html>

*Pyrola chlorantha* Sw.

Planta herbácea con un tallo de (5)10-30 cm. Hojas dispuestas en roseta laxa, bastante desiguales, con una lámina de 1-4 x 0,8-3,8 cm, suborbicular, al...

Vive en bosques húmedos, principalmente pinares de *Pinus sylvestris*, saprófito parcial en el mantillo, desde los 700 a los 1800 m....

Aparece en las montañas de casi toda Europa, Asia y N de América. Pirineos y otros montes del C y NE peninsular....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pyrola-chlorantha.html>

*Potamogeton natans* L.

Hierba acuática, perenne. Rizoma hasta de 3 mm de diámetro, con entrenudos de 15-130 mm, amarillento o anaranjado con pequeñas manchas rojizas. Tallos...

Crece en remansos de ríos, arroyos, lagos, lagunas y navajos de aguas permanentes, quietas y poco mineralizadas, desde el nivel del mar a los 1700(189...

Circumboreal y en regiones templadas del hemisferio norte. N,O y C de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/potamogeton-natans.html>

*Lucernariopsis cruxmelitensis* Corbin, 1978

Medusa con la campana con forma de embudo y de unos 8 mm de altura y unos 12 mm de diámetro, con un pedúnculo de unos 8 mm, pero con la base de la cam...



Vive en el intermareal y aguas poco profundas, normalmente en Chondrus, Gigartina y más raramente sobre Zostera....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lucernariopsis-cruxmelitensis.html>

## *Charadrius dubius* (Scopoli, 1786)

El chorlito chico es un ave limícola de pequeño tamaño, de unos 15-18 cm de longitud y unos 33 de envergadura. Su cabeza es voluminosa y en ella se ...

El chorlito chico vive en diferentes tipos de hábitats del interior, nidificando preferentemente en las orillas de los ríos con piedras y guijarros...

Aparece por Europa y Asia, donde se reproduce en zonas templadas, para invernar en África occidental. En la Península aparece en todas las regiones, s...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/charadrius-dubius.html>

## **Novedades corológicas**

### *Dasyscyphella pulverulenta* (Lib.) Baral (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pulide, Castrillón. O el día 27/01/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/dasyscyphella-pulverulenta-lib-baral-1/17884.html>

### *Pseudostypella translucens* (H.D. Gordon) D.A. Reid & Minter (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pulide, Castrillón. O el día 27/01/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pseudostypella-translucens-h-d-gordon-d-a-reid-minter/17881.html>

### *Steccherinum bourdotii* Saliba & A. David (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gobiendes, Colunga. O el día 02/02/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/steccherinum-bourdotii-saliba-a-david-1/17914.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Armeria alpina* Willd. (Magnoliophyta)

### *Ascobolus mancus* (Rehm) Brumm. (Ascomycota)

### *Ascocoryne solitaria* (Rehm) Dennis (Ascomycota)



*Centaurea bofilliana* Sennen ex Devesa & E. López (Magnoliophyta)

*Fumaria vaillantii* Loisel. (Magnoliophyta)

*Lucernariopsis cruxmelitensis* Corbin, 1978 (Cnidaria)

*Lycopodiella inundata* (L.) Holub (Pteridophyta)

*Steccherinum bourdotii* Saliba & A. David (Basidiomycota)

