



asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 463. Publicado el 10/02/2014

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Libellula quadrimaculata*. Por Pilar Fatou



Num. 463. Publicado el 10/02/2014

Descripciones de especies

Tachina grossa (Linnaeus, 1758)

Tachina grossa es una mosca de gran tamaño, de hasta unos 2 cm, la más grande de la familia Tachinidae, voluminosa, con el cuerpo negro y cubierto d...

Las especies de esta familia son endoparásitos de otros insectos, en especial de orugas de lepidópteros. En este caso, *Tachina grossa* parasita oruga...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/tachina-grossa>

Rubus saxatilis L.

Planta herbácea, rizomatosa. Rizoma corto, del que nacen anualmente turiones decumbentes y tallos fértiles suberectos, caducos. Turiones 10-30 cm; ...

Vive en lugares pedregosos de pinar, abetal, hayedo, pedregales, etc.; en suelo preferentemente calizo, desde los 1150 a los 2300 m de altitud...

Zonas boreal y templada de Europa -desde Islandia y Rusia ártica hasta las montañas del N de la Península Ibérica, Italia, Grecia y el Cáucaso-;...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/rubus-saxatilis>

Rhododendron ferrugineum L.

Arbusto 0,3-0,8(1,2) m, con un tronco más o menos erecto, de corteza lisa y ramas erectas, glabras, las jóvenes ferrugíneo-lepidotas. Hojas de (1,5...

Vive en bosques de pino negro (*Pinus uncinata*) y abeto (*Abies alba*), en suelos acidificados, sobre calizas o sobre materiales silíceos, desde los (10...

Alpes, Pirineos, el Jura, montañas del O de Yugoslavia. En la Península aparece en Pirineos...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/rhododendron-ferrugineum>

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)

Odonato de unos 4-5 cm de longitud y que alcanza hasta 8 cm de envergadura. En la cabeza la cara es de color amarillo, pero más claro que otras especi...

Puede encontrarse en zonas de aguas estancadas. En particular en las lagunas cenagosas y ciénagas profundas...





asturnatura

Revista asturnatura.com

En todo el hemisferio norte, en Europa, en Asia, también en Norteamérica. En Europa hasta el Círculo Polar incluido, en las zonas montañosas hasta...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/libellula-quadrinaculata>

Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)

Pequeña araña de 3.5-4.5 mm los machos y 4.5-8.5 mm las hembras. El prosoma es de color amarillento o pardo rojizo en el macho, con listas laterales...

Vive en los márgenes o en claros de bosques, incluso en los senderos que lo atraviesan, pero también en otros lugares, como en zonas ajardinadas. Con...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/araniella-cucurbitina>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Euphorbia cyparissias L. (Chloroplastida)

Heliotaurus ruficollis (Fabricius, 1781) (Arthropoda)

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) (Arthropoda)

Tachina grossa (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Trithemis kirbyi Selys, 1891 (Arthropoda)

