



## Num. 467. Publicado el 10/03/2014

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Phyllocladus mucosa*. Por Ricardo R. Fdez.



**Num. 467. Publicado el 10/03/2014**

## Descripciones de especies

### *Zoropsis spinimana* (Dufour, 1820)

Araña de 10-13 mm de longitud el macho y hasta 19 mm la hembra. Tiene como color base del cuerpo pardo amarillento o pardo grisáceo. El prosoma presen...

Vive principalmente en zonas oscuras de las casas, oculta bajo piedras o en la corteza de los árboles, para salir de noche a cazar. Es muy agresiva y ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/zoropsis-spinimana>

### *Stachys arvensis* (L.) L.

Hierba de (2,5)4,5-45 cm, anual. Tallos simples o divididos desde abajo, confrecuencia con cantos coloreados, de muy foliosos a casi afilos, a veces...

Crece pastizales terofíticos, en claros de bosque o matorral, en barbechos y campos de cultivo en substratos generalmente silíceos, arenosos o arcill...

S, W y C de Europa; región macaronésica. Casi toda la Península Ibérica salvo ciertas provincias con predominancia de substratos básicos...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stachys-arvensis>

### *Phyllodoce mucosa* Örsted, 1843

Anélido poliqueto de cuerpo largo y delgado, de hasta 150 mm, formado por unos 275 segmentos, que en su mitad posterior se atenúa gradualmente. El pro...

Vive en fondos de arena y fango, grava fangosa con conchas, bajo piedras, en praderas de *Zostera* marina y en rizomas de *Posidonia oceanica*. ...

Atlántico norte, desde Escandinavia hasta África occidental, y desde la bahía de Hudson hasta el golfo de México. Pacífico, desde Alaska hasta el sur ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phyllodoce-mucosa>

### *Cuthona nana* (Alder & Hancock, 1842)

Nudibranquio de hasta unos 20 mm de longitud, de cuerpo blanco translúcido o amarillento pálido, mientras que los ceras contienen lóbulos digestivos p...

Su dieta consiste en el hidroide *Hydractinia*, que puede crecer epizooica sobre cangrejos o conchas de moluscos....

Atlántico norte, incluyendo el sur de Europa y New Hampshire en Norteamérica. ...



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cuthona-nana>

## *Ascocoryne cylichnium* (Tul.) Korf

Macroscopía. Cuerpos fructíferos de 5 a 10 mm de diámetro, esféricos de jóvenes pero luego de turbinados a cupuliformes o discoidales, a menudo con un...

Crece en grupos sobre ramas en putrefacción y troncos de varios árboles caídos, frecuentemente de *Fagus sylvatica*, entre septiembre y febrero....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ascocoryne-cylichnium>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Clubiona comta* C. L. Koch, 1839 (Arthropoda)

*Coniochaeta tetraspora* Cain (Ascomycota)

*Cuthona nana* (Alder & Hancock, 1842) (Mollusca)

*Cyclope neritea* (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

ISSN 1887-5068

