



asturnatura

# Revista asturnatura.com



**Num. 470. Publicado el 31/03/2014**

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Cytinus hypocistis*. Por Iñaki Rojo Legarra



Num. 470. Publicado el 31/03/2014

## Descripciones de especies

### *Vicia pyrenaica* Pourr.

Hierba perenne, con rizoma estolonífero ramificado y turiones con hojas escuamiformes, trepadora, glabra o con pelos de c. 0,2 mm, esparcidos y erectos...

Vive en pastos alpinos, pastizales sobre suelos pedregosos o arenosos, grietas y fisuras de rocas, desde los 1000 a los 2550 m de altitud....

España y Francia (Alpes y Pirineos). Montañas del N, C y SE de España....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/vicia-pyrenaica>

### *Larinioides sclopetarius* (Clerck, 1757)

Araña de unos 6-8 mm de longitud los machos y 10-13 las hembras, de cuerpo aplanado. Prosoma de color pardo grisáceo con un ribete blanquecino y fino...

Suele aparecer en las cercanías de zonas donde haya agua, en las rocas o en puentes o casas de riberas, pero también zonas más secas. La tela es circular...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/larinioides-sclopetarius>

### *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel

Hierba anual, erecta, ascendente o procumbente, unicaule, casi glabra. Tallo(1)3-15(20) cm, erecto, filiforme, muy ramificado, generalmente glabro, ...

Crece en comunidades de terófitos en márgenes de arroyo, lagunas y charcas estacionales, en substratos húmedos y ácidos -arenas silíceas y graníticas...

S y O de Europa y N de África. Gran parte de la Península Ibérica -ocasional en el tercio E- y Baleares....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/exaculum-pusillum>

### *Chamaeiris reichenbachiana* (Klatt) M.B. Crespo

Rizoma de 12-25 mm de diámetro, con numerosas raíces fibrosas, flexibles, no engrosadas. Tallos 14-80 x 0,2-0,4 cm, simples o rara vez ramosos, subterráneos...

Crece en juncas y pastizales higrófilos, a menudo en suelos más o menos salinos de marjales o saladares, tanto en el litoral como en áreas intermedias...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Oeste de la Región Mediterránea, desde el S de Francia y N de Italia hasta Túnez. Principalmente en la mitad oriental de la Península Ibérica, ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/chamaeir-is-reichenbachiana>

## *Cerithiopsis tubercularis* (Montagu, 1803)

Concha de hasta 6.5 x 2.3 mm, alta, estrecha, cónica, con hasta 14 vueltas aplanadas con suturas profundas. Escultura a base de estrías espirales y ...

Se encuentra sobre esponjas, como *Halichondria panacea* e *Hymeniacion perleve*, asociada generalmente con *Lomentaria*, *Corallina* y otras algas rojas....

Desde las Azores y el Mediterráneo a Noruega....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/cerithiopsis-tubercularis>

## Novedades corológicas

### *Ramularia ari* Fautrey (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Oviedo, Oviedo. O el día 24/03/2014

Más información en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/ramularia-ari-fautrey-1/18240.html>

### *Sporormiella teretispora* S.I. Ahmed & Cain (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Fondo, Carreño. O el día 30/03/2014

Más información en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/sporormiella-teretispora-s-i-ahmed-cain-1/18293.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Bombus sylvarum* Linnaeus, 1761 (Arthropoda)

*Bombylius discolor* Mikan, 1796 (Arthropoda)

*Chamaeir is reichenbachiana* (Klatt) M.B. Crespo (Chloroplastida)

*Clamator glandarius* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Cystobasidium fimetarium* (Schumach.) P. Roberts (Basidiomycota)





*Delitschia marchalii* Berl. & Voglino (Ascomycota)

*Homalenotus quadridentatus* (Cuvier, 1795) (Arthropoda)

*Leucojum aestivum* L. (Chloroplastida)

*Lithobius variegatus* Leach, 1817 (Arthropoda)

*Ramularia ari* Fautrey (Ascomycota)

*Rosellinia mammiformis* (Pers.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

*Sporormiella longisporopsis* S.I. Ahmed & Cain (Ascomycota)

*Sporormiella minima* (Auersw.) S. I. Ahmed & Cain (Ascomycota)

*Sporormiella teretispora* S.I. Ahmed & Cain (Ascomycota)



9 771887 506008