



## Num. 481. Publicado el 16/06/2014

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Phoracantha recurva*. Por Iñaki Rojo Legarra



**Num. 481. Publicado el 16/06/2014**

## Descripciones de especies

*Halimium ocymoides* (Lam.) Willk. in Willk. & Lange

Sufrútice o arbusto de hasta 1 m de altura, erecto, raramente procumbente; ramillas cubiertas de pelos estrellados. Hojas de las ramas estériles 2-15 ...

Jarales o por excepción brezales, en clima algo húmedo y poco continental, en suelo ácido degradado, silíceo, desde los 200 a los 1900 m....

Península Ibérica y N de Marruecos. Mitad O y C de la Península, excepto en el N....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/halimium-ocymoides>

*Genista scorpius* (L.) DC.

Sufrútice o arbusto 0,3-2 m, muy ramificado, con las ramas divergentes y espinosas. Tallos terminados en una espina fuerte y punzante, con 8-10(13) c...

Crece en matorrales de sitios secos, sobre substratos arcillosos, yesosos, calizos o margosos, rara vez engranitos, desde los 50 a los 1800 m....

S de Francia, Península Ibérica, Marruecos (Tetuán). Casi toda la Península Ibérica, salvo en el tercio occidental....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/genista-scorpius>

*Cynoglossum creticum* Mill.

Planta herbácea de (20)30-70 (90) cm, bienal, con indumento blanquecino en sus partes jóvenes. Tallos simples, rara vez ramificados en la parte super...

Ruderal de lugares abiertos, pastos, cunetas, ribazos, barbechos, generalmente secos, también en ambientes húmedos de sotos, desde el nivel del mar a...

Circunmediterránea, llega hasta el centro de Europa y la Macaronesia -Azores, Madeira, Canarias-, naturalizada en Australia y Chile. Casi toda la Pe...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cynoglossum-creticum>

*Anemone narcissiflora* L.

Planta herbácea con un rizoma corto y cepa cubierta por restos fibrosos de color castaño. Tallo de (8)15-40(50) cm. Hojas patente-pilosas en los pecíol...

Pastos de los pisos subalpino y alpino, desde los 1500 a los 2600 m de altitud....

Europa, Asia, N de América. En la Península aparece en los Pirineos y en la Sierra del Aramo (Asturias). ...



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anemone-narcissiflora>

## *Agrostemma githago* L.

Planta herbácea con tallos de (10)30-100 cm, revestidos de pelos largos, aplicados y cenicientos. Hojas de 50-130 x 3-12 mm, connadas, con pelos aplica...

Mala hierba en campos de cereal, campos descuidados, caminos, cunetas, etc.; probablemente de introducción remota; aparec desde el nivel del mar a los...

Al parecer, nativa en la región mediterránea oriental, prácticamente presente hoy en toda Europa, Asia templada. N de África, ¿Canarias? y Norteaméri...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/agrostemma-githago>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Cryptocephalus vittatus* Fabricius, 1775 (Arthropoda)

*Cucullia scrophulariae* (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

*Halimium ocymoides* (Lam.) Willk. in Willk. & Lange (Tracheophyta)

*Hemipenthes morio* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Juglans nigra* L. (Tracheophyta)

*Lophodermium foliicola* (Fr.) P.F. Cannon & Minter (Ascomycota)

*Phoracantha recurva* Newman, 1840 (Arthropoda)

*Saitis barbipes* (Simon, 1868) (Arthropoda)

*Taphrina carnea* Johanson (Ascomycota)

*Trichodes leucopsideus* (Olivier, 1795) (Arthropoda)

*Viola canina* L. (Tracheophyta)

