



## Num. 486. Publicado el 21/07/2014

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Valeriana pyrenaica*. Por Ignacio Fernández Villar



**Num. 486. Publicado el 21/07/2014**

## Descripciones de especies

### *Silene colorata* Poir.

Planta anual, de 15-60 cm. Tallos erectos o ascendentes, de densamente villosa retrorso-pubérulos. Hojas de fuertemente espatuladas a lineares, serí...

Arvense y viaria; 0-1700 m....

Región mediterránea, N del Irán, Arabia y Canarias(Lanzarote). Toda la Península Ibérica excepto el N...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/silene-colorata.html>

### *Pistorinia hispanica* (L.) DC.

Planta 5-20 cm, anual, cuyo indumento glanduloso se incrementa progresivamente desde la base hacia el ápice. Tallos débiles, erectos, generalmente no...

Crece en arenas y suelos desnudos, desde el nivel del mar a los 1700 m....

C, S y raro en el N de la Península....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pistorinia-hispanica.html>

### *Medicago italica* (Mill.) Fiori

Planta herbácea anual, de procumbente a ascendente, ramificada y generalmente provista de hojas desde la base; partes vegetativas cubiertas de pelos ...

Crece en campos de cultivo y herbazales de taludes y camino, desde el nivel del mar a los 300 m de altitud....

Región mediterránea. Dispersa por la mitad occidental de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/medicago-italica.html>

### *Genista obtusiramea* J. Gay

Sufrútice de hasta 0,4 m, inerme, muy ramificado desde la base, con los entrenudos muy cortos, poco folioso, de aspecto efedroide. Tallos con 6-8 cos...

Abedulares, piornales y brezales, frecuentemente incendiados, sobre suelo ácido, desde los 1400 a los 2200 m....

Endémica del NO de la Península Ibérica...



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/genista-obtusiramea.html>

## *Digitalis lutea* L.

Hierba perenne, glabrescente. Cepa algo leñosa. Tallos (20)50-100 cm, finamenteestriados, glabros, de color pajizo brillante.Hojas inferiores 10-18(...)

Claros y márgenes de bosque más o menos húmedos, taludes, gleras y pie de cantiles, preferentemente en terrenosalgo pedregosos; (80)500-1800(2200) m...

O y C de Europa. Pirineos y Prepirineos,principalmente centrales y orientales, y en la cordillera litoral catalana...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/digitalis-lutea.html>

## Novedades corológicas

### *Mollisia juncina* (Pers.) Rehm (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en San Juan de la Arena, Soto del Barco. O el día 17/07/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/mollisia-juncina-pers-rehm-1/19361.html>

### *Phyllachora therophila* (Desm.) Arx & E. Müll. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. O el día 20/07/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//19398.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Digitalis lutea* L. (Magnoliophyta)

*Festuca rubra* L. (Magnoliophyta)

*Geranium phaeum* L. (Magnoliophyta)

*Mollisia juncina* (Pers.) Rehm (Ascomycota)

*Panorpa meridionalis* Rambur, 1842 (Arthropoda)

*Phaeosphaeria vagans* (Niessl) O. E. Erikss. (Ascomycota)



*Phyllachora therophila* (Desm.) Arx & E. Müll. (Ascomycota)

*Staehelina dubia* L. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008