



Num. 50. Publicado el 21/11/2005

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Elona quimperiana*. Por César Fernández González



Num. 50. Publicado el 21/11/2005

Descripciones de especies

Stenogramme interrupta Mont. ex Harv. (C.Agardh)

Alga roja fijada al sustrato por pequeños discos de unos 4 mm de diámetro del que salen hasta 4 frondes con una corta estipe. Las láminas son de ha...

Epilítica, hasta los 10 m de profundidad, en fondos de grava y piedras....

Desde las Islas Británicas a Canarias, Cabo Verde, Mediterráneo español, Japón, NO de América, Australia y Nueva Zelanda....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/stenogramme-interrupta>

Schottera nicaensis Guiry & Hollenberg (J.V.Lamouroux ex Duby)

Alga roja, de textura cartilaginosa. El talo está formado por un estolón postrado cilíndrico del que salen frondes erectas acintadas con una corta ...

Sobre rocas, en hendiduras horizontales hasta unos 15 m de profundidad en zonas generalmente expuestas....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo. Namibia, Sudáfrica, Chile, Australia y Nueva Zelanda....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/schottera-nicaensis>

Salaria pavo (Risso, 1810)

Blénido de unos 10 cm de longitud, de cuerpo robusto. La cabeza tiene un rostro agudo, con ojos casi en posición dorsal. Los apéndices supraorbital...

En fondos rocosos o arenosos, a veces cerca de la desembocadura de los ríos. Los machos son territoriales y son ellos los que generalmente guardan la...

De Francia a Marruecos y Mediterráneo....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/salaria-pavo>

Retusa truncatula (Bruguère, 1792)

Concha de aspecto frágil, de hasta 5 mm de longitud, cilíndrica, blanquecina o amarillenta, con la espiral no muy visible por estar hundida. Carece ...





asturnatura

Revista asturnatura.com

En arena, barro, fango, hasta unos 50 m de profundidad. Se alimenta de pequeños nudibranquios y de *Peringia ulvae*....

Desde el O de las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/retusa-truncatula>

Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810

Cuerpo fusiforme, esbelto, de hasta unos 4 m de longitud. La cabeza tiene un rostro puntiagudo, con fuertes mandíbulas con dientes de una sola cúspi...

Es una especie pelágica, que a menudo se encuentra en grupos. Se acerca a la costa a menudo. Se alimenta de peces como arenques o caballas y cefalóp...

Es una especie pelágica, que a menudo se encuentra en grupos. Se acerca a la costa a menudo. Se alimenta de peces como arenques o caballas y cefalóp...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/isurus-oxyrinchus>

Hemimycale columella (Bowerbank, 1874)

Esponja masiva o incrustante en oquedades o grietas, de hasta 10 mm de grosor y 30 cm de diámetro. La superficie presenta numerosos cráteres, con un...

En aguas poco profundas, sobre rocas u otros sustratos duros, hasta los 40 m de profundidad....

Sur de Noruega, O de las Islas Británicas, hasta las Azores y el Mediterráneo....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/hemimycale-columella>

Halarachnion ligulatum (Woodward) Kützing

Alga roja de 50 cm de longitud y de 2 a 200 mm de anchura. El disco basal, de 1 mm de diámetro, da origen a 1 o más frondes aplanadas, subcilíndric...

Sobre conchas, piedras, en aguas poco profundas hasta 15 de profundidad....

Desde Noruega al Mediterráneo....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/halarachnion-ligulatum>





asturnatura

Revista asturnatura.com

Gobius vittatus Vinciguerra, 1883

Gobio pequeño, que no sobrepasa los 6 cm de longitud. La cabeza es pequeña, y tiene los ojos en posición dorsal. La primera dorsal tiene 6 radios e...

En fondos rocosos, hasta unos 30 m de profundidad, en zonas generalmente umbrías....

Desde el Cantábrico al Mediterráneo. No muy abundante....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/gobius-vittatus>

Catenella caespitosa (Withering) L. M. Irvine

Alga roja de unos 20 mm de altura. Talo formado por una parte reptante a modo de estolón, cilíndrico, fino, con ramificación bastante irregular. É...

En rocas, bloques, también sobre madera, en el litoral superior de zonas calmadas y umbrías, soportando aportes de aguas salobre. El estolón es per...

Desde Noruega a Marruecos, también en el Mediterráneo y costa O de África. E y SE asiático....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/catenella-caespitosa>

Calyptraea chinensis (Linnaeus, 1758)

Concha semejante a las lapas, pero más aplanada, a modo de gorro chino, de 15 - 20 x 5 mm. En el interior presenta un septo o repliegue. La superfici...

Vive en el sublitoral, hasta los 20 m, sobre piedras o conchas. Es filtrador....

De las Islas Británicas al Oeste de África, también mediterránea....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/calyptraea-chinensis>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anthina flammea Fr. (Ascomycota)

Felimare fontandraui (Pruvot-Fol, 1951) (Mollusca)





asturnatura

Revista asturnatura.com

Artículos

Las Planarias; los gusanos planos

Por Menéndez Valderrey, J.L.



9 771887 506008