



## Num. 508. Publicado el 22/12/2014

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Echinopartum ibericum*. Por José Luis Porto Torres



**Num. 508. Publicado el 22/12/2014**

## Descripciones de especies

### *Rosa glauca* Pourr.

Arbusto de 1-4 m. Tallos rectos, rojizos, los jóvenes pruinosos; acúleos(2,5)4-8 (0,6)4-8(9,5) mm, homogéneos, finos, ligeramente curvos, con la...

Crece en setos y espinares del piso montano superior y parte del subalpino, desde los 1400 a los 1900(2100) m....

Montañas europeas, desde los Pirineos hasta los Balcanes y Cárpatos orientales; como introducida en Gran Bretaña, Suecia, Finlandia y Norteamérica. Pi...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rosa-glauca.html>

### *Ramaria neoformosa* R. H. Petersen

Macroscopía. Basidiomas ramificados y coraloides, de 6-12 x 5-10 cm, con un tronco ancho y corto de hasta casi 40 mm de diámetro, de color blanquecino...

Crece generalmente bajo hayas (*Fagus sylvatica*), en suelos calizos, durante verano y otoño....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ramaria-neoformosa.html>

### *Lactarius subumbonatus* Lindgr.

Macroscopía. Sombrero de 2 a 5 cm de diámetro, ligeramente convexo, después deprimido, con el margen en ocasiones lobulado y flexuoso; cutícula seca, ...

Crece durante verano y otoño bajo planifolios, especialmente robles y castaños....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-subumbonatus.html>

### *Echinopartum ibericum* Rivas Mart., Sánchez Mata & Sancho

Sufrútice o arbusto 0,2-1(2) m, frecuentemente compacto y espinoso, ceniciento verdoso durante la floración. Ramas opuestas o verticiladas, con 8 c...

Claros de piornales orófilos y de melojares, preferentemente sobre granitos o cuarcitas, desde los 750 a los 1900(2200) m de altitud....

Endémico del NO y C de la Península Ibérica...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/echinopartum-ibericum.html>

### *Cortinarius spilomeus* (Fr.) Fr.



Macroscopía. Sombrero de 2-5 cm de diámetro, inicialmente cónico, luego campanulado convexo, no o poco mamelonado, con el margen regular en enrollado,...

Crece bajo coníferas de montaña y bosques mixtos con abedules, entre musgos del género Sphagnum, durante el verano y el otoño...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cortinari-uspilomeus.html>

## **Novedades corológicas**

*Apiospora bambusae* (Turconi) Sivan. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. O el día 18/12/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/apiospora-bambusae-turconi-sivan-1/20860.html>

*Pluteus pouzarianus* Singer (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. O el día 18/12/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pluteus-pouzarianus-singer-1/20857.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Anthracobia subatra* (Rehm) M.M. Moser (Ascomycota)

*Apiospora bambusae* (Turconi) Sivan. (Ascomycota)

*Chrysolina mactata* (Fairmaire, 1859) (Arthropoda)

*Cystolepiota pulverulenta* (Huijsman) Vellinga (Basidiomycota)

*Mycena leptcephala* (Pers.) Gillet (Basidiomycota)

*Pluteus pouzarianus* Singer (Basidiomycota)

