



## Num. 511. Publicado el 12/01/2015

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Perichaena depressa*. Por Mikel Tapia Arriada



**Num. 511. Publicado el 12/01/2015**

## Descripciones de especies

### *Valerianella dentata* (L.) Pollich

Hierba anual con tallos de 3-30(40) cm, ramificados en la mitad superior o desde la base, con 3-6 dicotomías, rara vez simples, glabrescentes o con m...

Pastos terofíticos, ruderal y arvense, indiferente edáfica, desde el nivel del mar a los 1550(1790) m de altitud....

Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias), Europa -excepto el N-, NW de África, S de Rusia, y Cy SO de Asia. Dispersa por la mitad N de la Península ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/valerianella-dentata.html>

### *Tricholoma pseudonictitans* Bon

Macroscopía. Sombrero de 5-7 cm, de convexo a plano convexo, con un umbo ancho, con el margen enrollado y débilmente acanalado, con la cutícula lisa, ...

Crece en grupos pequeños asociado a Abies y Picea y otras coníferas pero también bajo planifolios como Quercus y Castanea....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tricholoma-pseudonictitans.html>

### *Russula atropurpurea* (Krombh.) Britzelm.

Macroscopía. Sombrero de 40-80 mm, de globoso a hemisférico al principio, luego aplanado; superficie lisa o algo desigual, sedoso brillante en tiempo ...

Hongo que crece de forma gregaria en bosques de Quercus, más raramente en Fagus sylvatica, en suelos neutros o ácidos, termófilos....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/russula-atropurpurea.html>

### *Ranunculus pyrenaicus* L.

Planta vivaz, de (3)5-20(25) cm, con tallo peloso apicalmente, con raíces cilíndricas, amarillentas, fibrosas o algo engrosadas. Hojas basales de oblo...

Neveros, cervunales y pastos de Festuca eskia, en substrato silíceo o suelos descalcificados, desde los 1700 a los 3000 m. ...

Pirineos centrales y orientales, más localizada en los occidentales....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-pyrenaicus.html>

### *Nepeta nepetella* L.



Hierba 20-98 cm, perenne, hermafrodita, con rizoma  $\pm$  vertical, sin raíces tuberosas. Tallos macizos, con pelos toectores de 0,1-2,5 mm, patentes o unc...

Matorrales, pie de cantiles, bordes de hayedo, márgenes de caminos y arroyos, baldíos y zonaspedregosas, desde los 50 a los 3100 m de altitud....

SO de Europa y NO de África. C y E de España....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nepeta-nepetella.html>

## **Novedades corológicas**

*Geopora nicaensis* (Boud.) M. Torre (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Selorio, Villaviciosa. O el día 05/01/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/geopora-nicaensis-boud-de-la-torre-1/20966.html>

*Sclerogaster gastrosporioides* Pilát & Svrcek (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. O el día 05/01/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//20963.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Bombus subterraneus* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Caenoplana coerulea* Moseley, 1877 (Platyhelminthes)

*Epistrophe eligans* (Harris, 1780) (Arthropoda)

*Mycena polyadelpha* (Lasch) Kühner (Basidiomycota)

*Pardosa lugubris* (Walckenaer, 1802) (Arthropoda)

*Perichaena depressa* Lib. (Mycetozoa)

*Quercus petraea* (Matt.) Liebl. (Magnoliophyta)

*Trichaptum fuscoviolaceum* (Ehrenb.) Ryvarden (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068

