



asturnatura

Revista asturnatura.com



**Num. 513. Publicado el 26/01/2015**

La revista *Revista asturnatura.com* es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación bilingüe en castellano con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Octospora affinis*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 513. Publicado el 26/01/2015

## Descripciones de especies

### *Viola rupestris* F.W. Schmidt

Planta perenne, herbácea, 2-6(15) cm, caulescente, con roseta de hojas basales, en general cortamente indumentada -sobre todo en pecíolos y pedú...

Pastos en litosuelos preferentemente calizos; (100)500-2200(2600) m....

Gran parte de Europa, Cáucaso, N y C de Asia, Himalaya y N de América. Cuadrante NE de la Península Ibérica y zonas calizas altas de la Cordille...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/viola-rupestris>

### *Lactarius uvidus* (Fr.) Fr.

Macroscopía. Sombrero de 4-10 cm de diámetro, al principio convexo, luego aplanado y al final deprimido, con el margen delgado, liso y enrollado. Cu...

Crece en zonas húmedas de bosques de planifolios y coníferas durante verano y otoño...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/lactarius-uvidus>

### *Anthus spinoletta* (Linnaeus, 1758)

El bisbita alpino es un ave de 17 cm de longitud y 27 cm de envergadura. Durante el invierno los adultos presentan un plumaje con las partes superiores...

El bisbita alpino vive en pastizales alpinos húmedos durante la época de cría, generalmente cerca de arroyos y turberas, evitando formaciones densas...

Se encuentra distribuido por los sistemas montañosos de la mitad sur de Europa y el centro de Asia. En invierno baja en altitud en desplazamientos de...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/anthus-spinoletta>

### *Anoplotrupes stercorosus* (Scriba, 1791)

Estos escarabajos miden de 12 a 19 mm de largo y su coloración general es negro azulada, metálica, con élitros azul cobalto, púrpura o verdes; p...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Los escarabajos peloteros forestales se encuentran en zonas arboladas con suelo arenoso, preferentemente en bosques de hayas, y se alimentan básicamente...

Se encuentran por toda Europa, hasta el sobre el grado 67° de latitud, y desde las llanuras a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, especialmente...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/anoplotrupes-stercorosus>

## ***Acer campestre* L.**

Árbol o arbusto hasta de 20 m, caducifolio, polígamo, de copa amplia, densa, ovado-redondeada. Ramas erecto-patentes; corteza ± lisa o acostillada...

Aislado o en pequeños grupos en hayedos, robledales, melojares, castañares, quejigares, abetales, pinares, bosques de ribera, etc., orlas de bosque...

Gran parte de Europa, Córcega, Cerdeña, Sicilia, el Cáucaso, Anatolia, N de Irán y Argelia (donde es muy raro); como naturalizado, en el E y O de...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/acer-campestre>

## **Novedades corológicas**

*Octospora affinis* Benkert & L.G. Krieglst. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Magarín, Tineo. O el día 20/01/2015

Más información en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/octospora-affinis-benkert-l-g-krieglst-1/21041.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Abutilon megapotamicum* St.Hil. & Naudin (Chloroplastida)

*Arge cyanocrocea* (Forster 1771) (Arthropoda)

*Octospora affinis* Benkert & L.G. Krieglst. (Ascomycota)

