



Num. 527. Publicado el 04/05/2015

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Platynereis dumerilii*. Por Ricardo R. Fdez



Num. 527. Publicado el 04/05/2015

Descripciones de especies

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758)

Coleóptero de 3-4 mm de longitud, con el cuerpo de forma abombada, con los lados formando una curva suave desde la cabeza a los élitros. Color general...

Este coleóptero herbívoro crece en zonas abiertas y se puede encontrar en *Saponaria officinalis* allá donde crece esta planta, pero también se alimenta...

Europa, norte de África y Asia, alcanzando China. Introducido en Norteamérica en el siglo XX (localizado en Pennsylvania en 1972)....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/subcoccinella-vigintiquatuorpunctata.html>

Jaminia quadridens (Müller, 1774)

Caracol de concha levógira, sólida, de 7-15 x 3.5-4 mm, de color córneo claro, débilmente brillante. Líneas de crecimiento irregulares, con 7.5-9 vuel...

Vive en zonas secas y templadas, apareciendo en pastos formados en laderas entre piedras, preferentemente en lugares calizos, alcanzando en los Alpes ...

De la Península Ibérica a Alemania central y el norte de Grecia....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/jaminia-quadridens.html>

Draba dedeana Boiss. & Reut.

Hierba perenne, cespitosa, pulviniforme, con tallos de (1,5)2-8(9) cm, erectos, simples, escaposos, vilosos, con pelos simples, bifurcados y estrella...

Fisuras de roquedos calcáreos, crestones venteados y pastos ralos sobre substratos ricos en bases en general; 650-2600 m....

Endemismo ibérico que aparece en el N y CE de la Península Ibérica, desde la Cordillera Cantábrica hasta el Pirineo Navarro y el S de Teruel....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/draba-dedeana.html>

Cynara cardunculus L.

Hierba perenne, espinosa, verdoso-blanquecina, con glándulas y pelos unicelulares largos, araneosos. Tallos hasta de 105 cm, erectos, simples o ramif...

Orillas de camino y carretera, barbechos y baldíos, etc., en suelos más o menos nitrificados, preferentemente básicos; 10-560 m....

Región Mediterránea y Macaronesia; introducida y naturalizada en América y Australia. Dispersa por la Península Ibérica y Baleares...



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cynara-cardunculus.html>

Alcea rosea L.

Hierba perenne con tallos de 1-2,5 m, erectos, tomentosos y estrellado-pubescentes cuando jóvenes, glabrescentes o esparcidamente pubescentes. Hojas l...

Cultivada como ornamental y medicinal....

Probablemente originaria de los Balcanes, se encuentra ocasionalmente naturalizada en Europa, América y Asia. Naturalizada en la Península, excepto e...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/alcea-rosea.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anthophora plumipes (Pallas, 1772) (Arthropoda)

Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. & G. Martens (Magnoliophyta)

Erica canaliculata Andrews (Magnoliophyta)

Jaminia quadridens (Müller, 1774) (Mollusca)

Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Arthropoda)

Platynereis dumerilii (Audouin y Milne-Edwards, 1833) (Annelida)

Podagricon fuscipes (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

