



Num. 534. Publicado el 22/06/2015

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Graphiola phoenicis*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 534. Publicado el 22/06/2015

Descripciones de especies

Ranunculus nigrescens Freyn

Planta herbácea perenne de 10-40 cm, con raíces tuberosas cilíndricas, de hasta 1 cm. Tallo erecto, unifloro -raramente bifloro-, peloso en la base, c...

Pastos, pinares, brezales y repisas de roca, principalmente en substrato silíceo; 950-2100 m...

Península Ibérica, principalmente en el cuadrante NO....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-nigrescens>

Pulsatilla vernalis (L.) Mill.

Planta herbácea vilosa, con un rizoma craso, horizontal. Hojas basales 1-pinnatisectas, persistentes, coriáceas, de segmentos pinnatífidos, tendiendo a...

Acidófila, por más que no raramente sobre calizas; 1700-3000 m. ...

N, C y SO de Europa. Pirineo y parte central de las montañas cantábricas....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pulsatilla-vernalis>

Potentilla cinerea Chaix ex Vill.

Hierba vivaz con una cepa de 1,7-7 mm de diámetro, en general ramificada, cubierta por restos pardos o pardo-negruzcos de las estípulas basales; renu...

Pastos pedregosos en claros de bosque y matorral bajo, páramos o laderas montañas soleadas; preferentemente en substrato calizo, raramente en silíceo...

Centro, S y E de Europa, W de Siberia y el Cáucaso. Dispersa por la mitad N y E de España....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/potentilla-cinerea>

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.

Planta sufruticosa de (25)30-35 cm, ramosa, cespitosa, con ramas que nacen de una cepa robusta, tendidas, levemente cubiertas hacia el ápice por un i...

Matorrales y tomillares esteparios y de crestería, siempre soleados, en terrenos pedregosos o fisuras de rocas calizas; 600-2000 m....

N de la región mediterránea y Marruecos, extendiéndose hacia los países centroeuropeos y euroasiáticos. En la Península Ibérica, sobre todo por el



in...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fumana-procumbens>

Carthamus lanatus L.

Hierba anual, por lo general unicaule, muy espinosa, de un verde claro o verde-grisácea, de glabrescente a muy pelosa, con pelos tectores unicelular...

Bordes de camino, ribazos, lindes de cultivo, campos cultivados o incultos, barbechos y herbazales de medios alterados en general, en todo tipo de su...

Macaronesia, Región Mediterránea y aledaños, desde la Península Ibérica y el NO de África hasta Crimea y el Cáucaso, y en Europa hasta el C de Franci...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carthamus-lanatus>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aeshna isoceles (Müller, 1767) (Arthropoda)

Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) (Arthropoda)

Centaurea graminifolia (Lam.) Muñoz Rodr. & Devesa (Tracheophyta)

Conocybe albipes Hauskn. (Basidiomycota)

Emus hirtus (Linnaeus 1758) (Arthropoda)

Graphiola phoenicis (Moug. ex Fr.) Poit. (Basidiomycota)

Hormathophylla spinosa (L.) P. Küpfer (Tracheophyta)

Linaria badalii Loscos (Tracheophyta)

Lophiostoma vicinum Sacc. (Ascomycota)

Russula zvarae Velen. (Basidiomycota)

Scutellinia crinita (Bull.) Lambotte (Ascomycota)

