



## Num. 542. Publicado el 17/08/2015

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Ribes alpinum*. Por Ignacio Fernández Villar



**Num. 542. Publicado el 17/08/2015**

## Descripciones de especies

### *Viola arvensis* Murray

Planta anual, raramente bienal, de (15)20-30(40) cm. Hojas mayores de limbo más o menos oval, en general de más de 1 cm de anchura -en las superiores ...

Campos de labor, terrenos baldíos, bordes de caminos, etc., 0-1800 m....

Gran parte de Europa, Siberia, Turquestán, Cáucaso, Asia Menor, Oriente Próximo, N de África, Madeira y Canarias. Al parecer más frecuente en la mit...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/viola-arvensis.html>

### *Sambucus racemosa* L.

Arbusto o pequeño arbolillo de (0,7)1-2(4) m, erecto, con tallos ramificados desde la base, con ramas rectas o arqueadas, de médula pardusca o de col...

Claros y orlas de bosques frescos de alta montaña, en substratos pedregosos, indiferente edáfica; (600)1100-1700(2070) m....

Circumboreal, condisyunciones subalpinas; a menudo cultivada como ornamental en el N de Europa y ocasionalmente naturalizada. Cuadrante nororiental...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sambucus-racemosa.html>

### *Potentilla alchimilloides* Lapeyr.

Hierba vivaz, con una cepa de 6-12 (15) mm de diámetro; tallos fértiles 1-2(3), de (5)10-30(45) cm x 1-1,5 mm de diámetro en la base, que sobrepasan ...

Fisuras y repisas de peñascos, preferentemente calizos y en zonas altas de montaña; (450)1000-2500 m. ...

Península Ibérica y Marruecos (Gran Atlas). En la Península, Sistema pirenaico-cantábrico, desde el Ripollés hasta el macizo de Valnera y N del Siste...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/potentilla-alchimilloides.html>

### *Linaria repens* (L.) Mill.

Hierba perenne, glabra, ligeramente glauca, con tallos fértiles 1-12, de 15-115 cm, erectos, simples o ramificados en la parte superior; tallos estér...

Claros de matorral y bosques, roquedos, ribazos, en substratos pedregosos silíceos o calizos; 0-2400 m. ...



Oeste de Europa; ampliamente naturalizada en el NW y C de Europa, y en otras regiones templadas del hemisferio N. Cuadrante NE de la Península Ibérica...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/linaria-repens.html>

## *Bupleurum rigidum subsp. rigidum* L.

Hierba perenne, de (12)30-150 cm. Tallos herbáceos, leñosos solo en la base, ramosos. Hojas todas similares o a veces las basales diferentes en la forma...

Bosques y matorrales mediterráneos, en todo tipo de substratos; 0-1500 m....

Península Ibérica, S de Francia, N de Italia y NW de África. Buena parte de la Península Ibérica, más raro hacia el W, y Baleares. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bupleurum-rigidum-subsp-rigidum.html>

## **Novedades corológicas**

*Ceriporia camaresiana* (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer (Basidiomycota)

Nueva para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Panizales, Castrillón. O el día 12/08/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ceriporia-camaresiana-bourdout-galzin-bondartsev-singer-1/22844.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Carduus carlinifolius* Lam. (Magnoliophyta)

*Ceriporia camaresiana* (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer (Basidiomycota)

*Chondrina tenuimarginata* (Des Moulins 1835) (Mollusca)

*Daphne mezereum* L. (Magnoliophyta)

*Homalenotus laranderas* Grasshoff, 1959 (Arthropoda)

*Hylotrupes bajulus* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Ischyropsalis hellwigi* (Panzer 1794) (Arthropoda)

*Pinguicula longifolia* Ramond (Magnoliophyta)



*Pinus nigra* J.F. Arnold (Pinophyta)

*Plumbago europaea* L. (Magnoliophyta)

*Pluteus luctuosus* Boud. (Basidiomycota)

*Psathyrella globosivelata* Gröger (Basidiomycota)

*Trichodes apiarius* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

